



Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Resultados por entidad federativa

SALUD

Puebla



Encuesta Nacional de Adicciones 2008
Resultados por entidad federativa, Puebla

Encuesta Nacional
de **Adicciones**
2008

Resultados por entidad federativa

Puebla

Encuesta Nacional de Adicciones 2008, **Resultados por entidad federativa, Puebla**

Primera edición, febrero 2009

D.R. © Instituto Nacional de Salud Pública
Av. Universidad 655, Col. Santa María Ahuacatlán
62508 Cuernavaca, Morelos, México

Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico

ISBN: 978-607-7530-41-1

La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 es un esfuerzo de la Secretaría de Salud, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, en el cual participaron el Instituto Nacional de Salud Pública, que fue responsable del operativo de campo y del diseño conceptual e interpretación de los datos de tabaco, y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que tuvo a su cargo el diseño del cuestionario, la capacitación de los encuestadores, la supervisión de campo, el diseño conceptual y el análisis de las secciones de drogas y alcohol.

La Encuesta se realizó con apoyo financiero de la Secretaría de Salud, así como con financiamiento adicional de la Fundación Gonzalo Río Arronte y la Embajada de los Estados Unidos para la supervisión de campo y el análisis de datos.

Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Coordinación general

Carlos Rodríguez Ajenjo
Consejo Nacional contra las Adicciones

Coordinación técnica

Jorge A. Villatoro Velázquez
María Elena Medina-Mora Icaza
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Coordinación logística

Martha María Téllez-Rojo
Claudia Díaz Olavarrieta
Laura Mendoza Alvarado
Instituto Nacional de Salud Pública

Diseño conceptual

Carlos Rodríguez Ajenjo
Consejo Nacional contra las Adicciones

María Elena Medina-Mora Icaza
Jorge A. Villatoro Velázquez
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Diseño conceptual sección de tabaco

Eduardo Lazcano
Instituto Nacional de Salud Pública

Diseño logístico

Juan Pablo Gutiérrez
Manuel Castro Tinoco
Instituto Nacional de Salud Pública

Diseño y control muestral

Oswaldo Palma Coca
Isaac Sidhartha Salcedo Campos
Alaín López Condado
Instituto Nacional de Salud Pública

Capacitación general drogas y alcohol

Clara Fleiz Bautista
Jorge A. Villatoro Velázquez
Francisco Juárez García
María Elena Medina-Mora Icaza
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Supervisión de práctica de capacitación

Ma. de Lourdes Gutiérrez López
Midiam Moreno López
Michelle Bretón Cirett
Filiberto Itzcóatl Gaytán Flores
Vianney Sánchez Pineda
Elsa Nancy Magaña Méndez
Mitzi Roxana Razo Guzmán
Miguel Ángel López Brambila
María Estela Rojas Guiot
Lianed Gaytán López
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Levantamiento de campo

Juan Pablo Gutiérrez
Manuel Castro Tinoco
Instituto Nacional de Salud Pública

Supervisión de trabajo de campo

Clara Fleiz Bautista
Vianney Sánchez Pineda
Filiberto Itzcóatl Gaytán Flores
Elsa Nancy Magaña Méndez
Mitzi Roxana Razo Guzmán
Miguel Ángel López Brambila
Michelle Bretón Cirett
Midiam Moreno López
María Estela Rojas Guiot
Lianed Gaytán López
Jorge A. Villatoro Velázquez
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Desarrollo de sistemas y bases de datos

Oswaldo Palma Coca
Alaín López Condado
Daniel Acosta Vargas
Francisco Javier Carlos Rivera
Isaac Sidhartha Salcedo Campos
Claudia Irene Larracilla Camacho
Instituto Nacional de Salud Pública

Análisis estadístico de drogas y alcohol

Jorge A. Villatoro Velázquez
Ma. de Lourdes Gutiérrez López
Midiam Moreno López
Jerónimo Blanco Jaimés
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Elaboración del reporte de drogas y alcohol

Jorge A. Villatoro Velázquez
María Elena Medina-Mora Icaza
Clara Fleiz Bautista
Patricia Cravioto
Ma. de Lourdes Gutiérrez López
Midiam Moreno López
Nieves Quiroz del Valle
Mario Cortés
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Carlos Rodríguez Ajenjo
Consejo Nacional contra las Adicciones

Elaboración del reporte de tabaco

Eduardo Lazcano
Instituto Nacional de Salud Pública

Reporte metodológico

Martha María Téllez-Rojo
Claudia Díaz Olavarrieta
Juan Pablo Gutiérrez
Oswaldo Palma Coca
Instituto Nacional de Salud Pública

Clasificación de sustancias psicoactivas

Mario Gómez
Arturo Ortiz
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Consejo asesor

Guilherme Borges Guimaraes
Guillermina Natera Rey
Patricia Cravioto
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Rafael Lozano
Patricia Nilda Soliz
Dirección General de Información en Salud

Víctor Guiza
Ricardo Sánchez Huesca
Centros de Integración Juvenil

Carlos Magis
CENSIDA

Contenido

Prólogo	11
Presentación	13
Antecedentes del consumo de drogas y alcohol en Puebla	15
Método	17
Tabaco	23
Principales resultados	24
Conclusiones	30
Drogas	31
Principales resultados	32
Conclusiones	34
Alcohol	35
Principales resultados	36
Conclusiones	37
Referencias	40
Glosario	41
Anexos	45
A. Drogas	46
Resultados del estado	46
Intervalos de confianza	59
B. Alcohol	63
Resultados estatales	63
Intervalos de confianza	69
C. Estadísticas de fuentes estatales sobre antecedentes de consumo de drogas	70

La información confiable y oportuna es una de las herramientas más valiosas para la toma de decisiones, el diseño de programas y políticas públicas de atención y prevención y de apoyo en la definición de la normativa en materia de salud. En ella se apoya de manera sustantiva la gestión estratégica que busca atender de manera efectiva los problemas de salud de los mexicanos.

En la actualidad las adicciones son una prioridad a nivel global y nacional, que por su magnitud y consecuencias nos requiere estar bien informados para poder dirigir de manera precisa y contundente nuestros recursos y esfuerzos.

Las encuestas nacionales son una metodología muy útil a este fin y México tiene amplia experiencia en su realización, un ejemplo son las encuestas nacionales de adicciones (ENA) que se vienen realizando desde 1988, de las cuales la quinta y más reciente, la ENA 2008, se realizó entre los años 2007 y 2008. En ella destaca su diseño probabilístico polietápico, que ha permitido la representatividad nacional, urbano-rural, regional y ahora por entidad federativa. Luego de presentar el reporte de la ENA 2008 con los datos nacionales, establecimos el compromiso de difundir en breve las estadísticas estatales, que por primera ocasión permitirán conocer en forma específica para cada estado el comportamiento de las adicciones.

Con las ENA hemos podido conocer más acerca de la magnitud y distribución de las adicciones; identificar algunas variables a las cuales se asocian más frecuentemente; generar hipótesis de investigación; contribuir en el conocimiento de su historia natural, así como evaluar medidas de control y detectar cambios en las prácticas médicas y de salud.

Estoy plenamente convencido de que el esfuerzo quedaría inacabado si la información generada en la Encuesta no llega a las manos de los gestores a nivel local y de los ciudadanos en general, en donde se vive de manera inmediata esta problemática. Tenemos la obligación de difundirla de manera que sirva para construir nuevos conocimientos que deban utilizarse no sólo para comprender y predecir, sino para modificar políticas, estrategias, programas y comportamientos, y como mecanismo para la movilización social de voluntades, recursos y la generación de compromisos. Ante la evidencia confiable, no existe duda.

A nivel nacional, la ENA 2008 muestra que el problema más importante en adicciones en México está en el abuso del consumo de

bebidas alcohólicas, con las graves consecuencias familiares, sociales y comunitarias, y en el uso de tabaco, arraigados ambos en muchas poblaciones, tanto rurales como urbanas, y que está cobrando víctimas en los jóvenes que se inician en su consumo a edades cada vez más tempranas.

En el caso de las drogas ilegales, en México se ha generado un mercado de consumidores similar al de algunos países europeos y de otros como Perú o Colombia, originando un daño cada vez mayor, tanto a la salud como a la armonía social y a la gobernabilidad. Las cifras muestran que cada vez existe mayor exposición al consumo y es mayor la facilidad con la que se consiguen las drogas entre los jóvenes.

Los resultados que presentamos para las 32 entidades federativas muestran que las adicciones son un problema generalizado, con sus especificidades dependiendo de variables como tipo de droga, intensidad, edad, sexo, residencia, etc., y que se deben tener presentes.

En general se destaca, en cuanto al consumo de tabaco, que 20.4% de la población urbana entre los 12 y los 65 años de edad son fumadores activos, en tanto que en las localidades rurales la proporción es de 11.3 por ciento. Para el caso del consumo de alcohol, fueron los estados del centro-occidente los de alto consumo, donde se ubican Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Querétaro.

Para el consumo de drogas ilegales y médicas, los datos de la medición mostraron que dos estados fronterizos tienen el mayor consumo, Quintana Roo en el sur y Tamaulipas en el norte, con una incidencia de 11.2 y 11.1 por ciento. Junto con ellos se ubican 12 entidades federativas más que registraron una incidencia acumulada de cualquier clase de droga, en población rural y urbana entre los 12 y los 65 años de edad, por arriba de los intervalos de confianza de la prevalencia nacional.

De esta manera ponemos a disposición de la sociedad en general la información estatal de la ENA 2008, la cual es parte del esfuerzo sistematizado que la administración federal, a cargo del C. Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, está realizando, en coordinación con los gobiernos estatales, para enfrentar el problema de quienes consumen, abusan o ya dependen de las drogas, y disminuir sus graves consecuencias a través de la aplicación de políticas públicas claras, consistentes y de largo plazo, que integran en una acción sinérgica todos los recursos disponibles de las institu-

ciones y están siendo una gran oportunidad para una responsabilidad social compartida, entre los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil organizada y los ciudadanos.

La realización de la ENA 2008, coordinada por la Secretaría de Salud, fue posible gracias a la participación y compromiso de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, del Consejo Nacional contra las Adicciones, y a la colaboración de otras instancias como el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el Instituto Nacional de Salud Pública.

Reconozco de la misma manera el destacado apoyo recibido por parte de las entidades federativas, organizaciones y personas que hicie-

ron posible la realización de la Encuesta, a los que han contribuido a su financiamiento y a los que difunden los resultados derivados de ella.

Las bases de datos estarán también disponibles para la sociedad en general, los tomadores de decisiones, los académicos, los investigadores, etc., esperando que el dato se convierta en conocimiento transformador, como lo expresara Sócrates hace ya muchos años: "Sólo es útil el conocimiento que nos hace mejores".

Dr. José Ángel Córdova Villalobos.
Secretario de Salud.

Presentación

En nuestro actual entorno social, el consumo de drogas juega un papel muy importante. Debido a ello, los esfuerzos de prevención deben enfocarse a fortalecer a los adolescentes y jóvenes en riesgo de consumo con el desarrollo de habilidades (comunicación, resolución de conflictos, etc.). El Programa Nacional de Salud 2007-2012, en su búsqueda por mejorar las condiciones de salud de la población, tiene entre sus principales objetivos disminuir los niveles de consumo de drogas en la población, en donde los adolescentes y jóvenes tienen prioridad. Para el cumplimiento de esta tarea, se tiene el Programa contra las Adicciones, que integrado a las acciones de Promoción de la Salud y Prevención y Atención de las Enfermedades, constituye una respuesta sin precedentes para revertir los crecientes índices de prevalencia de problemas de adicción.

El fenómeno del consumo, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas legales o ilegales muestra una preocupante evolución. Sus principales indicadores revelan un incremento de las prevalencias de consumo, así como una disminución en las edades de inicio, principalmente para las drogas introductorias como el tabaco y el alcohol. Una de las metodologías más útiles para observar la evolución de este fenómeno es la realización de estudios transversales con encuestas de hogares que se realizan con periodicidad fijada de manera convencional en muestras representativas nacionales. Esto se ha venido desarrollando a través de la realización de la Encuesta Nacional de Adicciones en sus versiones anteriores.

La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA 2008) se realizó en hogares y, además de los valiosos resultados sobre el consumo y las actitudes de la población ante los diversos tipos de drogas, permite tener datos comparativos de dos ciclos de 10 años cada uno (1988-1998-2008), es decir, cuatro lustros de estudio del problema en los que se realizaron cinco encuestas mediante las que es posible observar con mejor precisión las modificaciones en las prevalencias nacionales. Por lo tanto, la ENA 2008 nos brinda información esencial para observar cómo evoluciona el proceso, para saber qué sustancias son las más utilizadas y por quién, a fin de planificar adecuadamente los programas y las acciones que en materia de adicciones debe realizar el gobierno en tanto autoridad rectora en la materia. Hay que resaltar que, debido al tipo de información que recoge, el desarrollo de esta Encuesta se topó con una serie de dificultades para su levantamiento, finalmente resueltas para poder alcanzar los resultados en el ámbito estatal que aquí se engloban.

En lo relacionado con el consumo de drogas, la ENA 2008 presenta un escenario de salud pública donde en los grupos de 12 a 17 años es comparativamente mayor (hasta en 30%) la exposición a la

oportunidad de consumirlas y en el que la cifra de personas afectadas por adicciones ha crecido en los últimos seis años hasta cerca de 50 por ciento. Asimismo, la edad de inicio del consumo de drogas se ha adelantado hasta los 18 y 20 años, respectivamente, para hombres y mujeres, y estas últimas duplicaron su participación en el consumo. La Encuesta ha logrado identificar las seis principales sustancias adictivas de mayor consumo en la población y que la oferta de sustancias que ha invadido al país se ha elevado considerablemente. El principal beneficio que los tomadores de decisiones obtienen con los datos que proporciona la ENA 2008 es que, en el escenario de la política de salud, la prevención, la detección oportuna y las intervenciones breves son las acciones que han demostrado ser más costo-efectivas para enfrentar el complejo problema de las adicciones.

La principal diferencia entre las encuestas anteriores y esta quinta consiste en la representatividad estatal, lo que permitirá a los estados iniciar un proceso de medición; es decir, un seguimiento de la prevalencia del consumo en la población al interior de cada entidad con base en un conteo metodológico bien estructurado.

La serie de resultados estatales de la ENA 2008 abre una nueva perspectiva en la salud pública y la epidemiología de las adicciones en cada una de las 32 entidades federativas del país. Además de que hoy se cuenta con información que permite supervisar y tomar decisiones en el ámbito estatal, se cubre un vacío de información que era necesaria para la instrumentación de acciones de intervención, prevención y promoción de ambientes saludables. De igual modo, la información que se incluye constituye una referencia básica para el desarrollo de programas de intervención adecuados a las necesidades de cada entidad federativa.

Contar con este tipo de herramientas metodológicas plantea también un reto a los sistemas de salud estatales, ya que éstas se convierten en el observatorio que mide, si bien transversalmente, los éxitos en la lucha contra el consumo de drogas. Igualmente se constituyen en el elemento básico para el tomador de decisiones en el proceso de evaluación. Los resultados por entidad federativa de la ENA 2008 son una contribución más al conocimiento en salud y se convierten en parte de la rendición de cuentas que hoy es compromiso fundamental del trabajo en salud pública, especialmente en lo referente al combate contra el abuso de las drogas.

Dr. Mauricio Hernández Ávila
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
Secretaría de Salud

Antecedentes del consumo de drogas y alcohol en Puebla

Nuestro país cuenta con una amplia experiencia acumulada en la investigación, de corte epidemiológica y psicosocial, sobre consumo de drogas, alcohol y tabaco. Estas investigaciones se han llevado a cabo continuamente desde la década de los setenta con una misma metodología, utilizando técnicas de recolección y análisis uniformes para cada tipo de población estudiada, lo cual ha permitido conocer el panorama global que guarda dicho fenómeno en distintos escenarios, entre los cuales se encuentran los hogares, las escuelas y los centros de tratamiento. Asimismo, a través de estos esfuerzos en investigación se han identificado, en dichos escenarios, los patrones de consumo, los grupos más vulnerables, las tendencias a lo largo del tiempo, las características sociodemográficas más importantes que predicen o protegen de dicho consumo, entre otros aspectos relevantes relacionados con el ámbito social de las adicciones (anexo C).

En este contexto, a continuación se muestran los resultados arrojados por estos estudios realizados en el país, como preámbulo y referencia de los resultados encontrados en esta entidad en la Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

Es importante destacar que con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 por primera vez se cuenta con un informe para cada estado de la República, además de un Reporte Nacional para población rural y urbana de 12 a 65 años. En las encuestas nacionales previas (ENA 1988, 1993, 1998, 2002),¹⁻⁴ se obtuvieron datos regionales y en el ámbito nacional; en las encuestas de 1988, 1993 y 1998 se obtuvieron datos con población urbana, y en la encuesta de 2002 se tuvieron datos para población rural y urbana.

En el caso específico de Puebla se tienen pocos antecedentes estatales en las encuestas nacionales de adicciones y en comunidad escolar que permitan hacer comparaciones con los datos de la Encuesta de 2008. En el primer caso, el estado se ha incluido en la región centro del país, junto con otras entidades que en 1988 y 1998 reportaron un consumo similar al promedio del país de drogas médicas e ilegales.

Sin embargo, se sabe que Puebla es uno de los estados con menor prevalencia de la región.

En estudiantes se cuenta con el antecedente de las encuestas que se realizaron en 1991, las cuales se describen más adelante.

Por lo que respecta a centros de tratamiento, se cuenta con amplia información derivada del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones (SISVEA*) y de los Centros de Integración Juvenil (CIJ).

Encuestas en estudiantes

En el estado de Puebla, el único estudio previo en población escolar es la Encuesta Nacional de Estudiantes que se realizó en 1991. Los resultados de la medición indicaron que 9.4% del total de la muestra había consumido al menos una droga en su vida, sin incluir tabaco ni alcohol, por arriba del promedio nacional (8.2%). Por sexo, la proporción de hombres que experimentó con drogas al menos una vez fue superior a la de mujeres (10 y 9%, respectivamente). Por tipo de sustancia los inhalables (4.4%), los tranquilizantes (2.8%) y las anfetaminas (2.2%) fueron las sustancias más consumidas en los estudiantes.⁵

En lo que respecta al consumo de alcohol 52.1% del total de la población estudiantil había consumido alcohol alguna vez en la vida, y por sexo, se encontró la misma prevalencia de consumo en ambos sexos (55.9%).

* Para la recolección de información el SISVEA se basa en el "reporte de eventos" de aquellas personas que han acudido a distintas instituciones gubernamentales y organismos no gubernamentales a solicitar tratamiento por consumo de drogas. Da cuenta sobre los casos o pacientes (eventos) que acuden a tratamiento a los diferentes centros de atención (gubernamentales y no gubernamentales) en un estado y esa información se refiere únicamente a la demanda real (efectiva) de atención.

También registra las muertes asociadas al consumo. Es importante señalar que el número total de estos eventos puede exceder el de los individuos en contacto con las instituciones que los reportan en un tiempo determinado, toda vez que el mismo individuo puede ser contactado por más de una institución, con lo que puede ser cuantificado en diversos reportes de evento.

SISVEA

Mediciones realizadas en los centros de tratamientos no gubernamentales

De acuerdo a los datos registrados por este sistema, en el estado de Puebla la búsqueda de tratamiento ha presentado un incremento importante de 2002 a 2007. Por ejemplo, en 2002 se registraron cinco personas mientras que para 2007 la demanda de tratamiento ascendió a 1,586 casos. En total en el periodo comprendido se registraron un total de 4,278 personas.⁶

Por otra parte, el perfil sociodemográfico de las personas que acudieron a tratamiento en este periodo, indica que la mayoría son hombres (91.5%). Por grupos de edad, destaca la población adulta de 35 años o más (43.4%). Por nivel educativo la mayoría tiene primaria (38%). En cuanto al estado civil, casi la mitad de esta población es soltera (43.5%) y más de una cuarta parte está casada (27.3%). Respecto a su situación laboral, una tercera parte cuenta con un trabajo fijo (32.1%) y otra con un trabajo ocasional (33.1%). La mayoría de los usuarios asiste por influencia de amigos y familiares a buscar ayuda (70.1%).

Asimismo, entre 2006 y 2007, las drogas ilegales más consumidas entre la población que acudió a estos centros fueron la marihuana (32.7%), la cocaína (26.7%) y los inhalables (24.5%).

Respecto a las drogas de inicio, los datos de 2007, registraron que en los hombres el alcohol (66%) y el tabaco (14.7%) y en las mujeres el alcohol (56.8%) y los inhalables (15.5%) fueron las principales drogas de inicio. En cuanto a la droga de impacto* que motivó la búsqueda de ayuda en ambos sexos fue el alcohol (62.3% hombres y 57.4% mujeres) y la cocaína (12.1% hombres y 16.8% mujeres).

Mediciones realizadas en los Centros de Integración Juvenil (CIJ)

La información obtenida en los CIJ sobre el perfil sociodemográfico de las personas que acudieron a tratamiento ambulatorio en el 2007,

muestra coincidencias importantes con lo registrado por SISVEA en instituciones no gubernamentales. De tal forma que, la mayor parte de la población que acudió a esta institución en el estado de Puebla fue del sexo masculino (386 varones y 111 mujeres). En cuanto a la edad, la mayoría fueron jóvenes entre 15 y 19 años (n=136) y adultos de 35 años o más (n=97). En cuanto al estado civil y la escolaridad, la mayoría eran solteros (n=234) y habían estudiado hasta la secundaria (n=201). En lo que respecta a la ocupación, la mayor parte contaba con un trabajo estable (n=134) y otro grupo importante eran estudiantes (n=124). El nivel socioeconómico de la mayoría fue bajo (n=288)⁽⁷⁾.

El tabaco (49.7% hombres y 45% mujeres) y el alcohol (32.6% hombres y 45.9% mujeres) son las principales drogas de inicio en ambos sexos. En cuanto a la droga de impacto, en los hombres y en las mujeres fue el alcohol (34.3% y 39%, respectivamente).

Mediciones realizadas en los consejos tutelares de menores

Los datos obtenidos por los consejos tutelares de menores indican que del grupo de menores infractores usuarios de drogas, el 92.9% es población masculina. En cuanto al nivel educativo el 54% contaba con escolaridad máxima de primaria. En lo que respecta al uso de drogas, la mayoría consume alcohol, tabaco, marihuana e inhalables. La infracción que cometió el 67% de esta población fue el robo (0.8)

Mediciones realizadas en el sistema epidemiológico y estadístico de las defunciones

En Puebla, el número de defunciones debidas al consumo de alcohol es de 1,492 habitantes, cifra que corresponde al 10.3% del total de muertes por dicha causa registradas en el país. Asimismo, las defunciones ocasionadas por la enfermedad alcohólica del hígado y por el uso de tabaco fueron 707 y 39, respectivamente, que equivalen al 8.7% y 1.5% del total de muertes.⁹

* Droga de impacto definida ésta como la que el paciente identifica con mayor capacidad para producirle efectos negativos (de salud, familiares, laborales, etc.) y que lo motiva a solicitar atención médica.

La Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud, así como del Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones (ST-CONADIC), encomendó al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) la realización de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA 2008). Sus objetivos incluyen generar información confiable y caracterizar la prevalencia del uso de tabaco, alcohol y drogas en la población adolescente de entre 12 y 17 años de edad y en la población adulta de entre 18 y 65 años. La encuesta busca también conocer los factores asociados a la utilización de estas sustancias, así como las necesidades de atención y el uso de servicios relacionados con el abuso de las mismas.

Objetivos

Los objetivos que se plantearon para la ENA 2008 son:

- Evaluar la prevalencia del uso de drogas tanto médicas (consumidas fuera de prescripción) como no médicas, alcohol y tabaco en los ámbitos nacional y estatal
- Evaluar las tendencias en el consumo de sustancias en una muestra representativa de las poblaciones urbana y rural del país

La ENA 2008 es una encuesta de hogares con representatividad nacional y estatal, en la que se encuentran representadas poblaciones rurales –aquéllas con un número de habitantes menor o igual a 2 500– y urbanas –aquéllas con más de 2 500 habitantes–. La selección de las unidades muestrales se realizó en múltiples etapas: áreas geoestadísticas básicas (AGEB), manzanas o segmentos, viviendas y, finalmente, personas dentro de los hogares. La selección de viviendas se hizo a partir de los croquis y listados elaborados en campo usando una técnica de muestreo aleatorio sistemático.

En cada hogar, siempre que la composición del mismo lo permitiera, se seleccionó un adulto de entre 18 y 65 años de edad y un adolescente de entre 12 y 17 años. La selección se llevó a cabo mediante una técnica de muestreo aleatorio simple en cada uno de los dos grupos de edad.

Los resultados obtenidos por la ENA 2008 permiten:

- Identificar los estados de mayor riesgo en relación con el problema de consumo de drogas
- Evaluar la relación de los factores de riesgo ambientales, interpersonales, familiares y personales con la experimentación, el uso habitual y el uso problemático de drogas, alcohol y tabaco
- Desarrollar y evaluar modelos de predicción de consumo de drogas, alcohol y tabaco, con el fin de incidir en la creación e implementación de programas de prevención
- Retroalimentar a los sectores de salud y educativos, con el fin de desarrollar y fortalecer medidas preventivas sobre el uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco
- Diseñar nuevas líneas de investigación en el campo del abuso de sustancias
- Conocer la relación que existe entre uso de drogas, comportamiento antisocial, violencia y sintomatología depresiva

Es importante considerar que a pesar de que se eligieron muestras con el mismo diseño y que se mantuvieron estables la mayor parte de las condiciones de las encuestas 2002-2008, hay importantes diferencias; por ejemplo, la encuesta de 2008 se realizó mediante computadora en tanto que la de 2002 se efectuó en una versión lápiz y papel. Adicionalmente, cambiaron las definiciones de consumo alto para las mujeres, ya que internacionalmente se considera para ellas el que hayan consumido 4 copas o más, a diferencia de las 5 copas consideradas en las encuestas anteriores.

Unidades de análisis

Las unidades de análisis definidas para la ENA 2008 son las siguientes:

- Hogar es el conjunto de personas, relacionadas por algún parentesco o no, que habitualmente duermen en una vivienda bajo el mismo techo, beneficiándose de un ingreso común, aportado por uno o más de los miembros
- Adolescentes son las personas del hogar cuya edad se sitúa entre los 12 y 17 años
- Adultos son las personas del hogar cuya edad se sitúa entre los 18 y 65 años

Cobertura geográfica y de unidades

La información obtenida a través de la ENA 2008 permitirá el cálculo de indicadores estatales con representatividad de las áreas urbanas y rurales de cada entidad federativa. Por razones de tipo operativo no se incluyeron viviendas colectivas tales como instalaciones militares, cárceles, conventos, hoteles, asilos, etcétera.

Estratificación

Debido a que las Encuestas Nacionales de Adicciones realizadas en 1998 y 2002 señalan la existencia de importantes diferencias para los indicadores de interés según el tamaño de la localidad, para el diseño de la ENA 2008 se decidió estratificar por el tamaño de la localidad, según se muestra en el siguiente cuadro:

Estrato	Descripción
I. Ciudad o área metropolitana	<ul style="list-style-type: none"> • Ciudades y áreas metropolitanas • Ciudades de 100 000 y más habitantes y/o capitales de estado
II. Complemento urbano	<ul style="list-style-type: none"> • Localidades de 2 500 a 99 999 habitantes
III. Rural	<ul style="list-style-type: none"> • Localidades con menos de 2 500 habitantes

La asignación del tamaño de muestra para cada estrato se hizo de manera proporcional al número de habitantes dentro del estrato.

Tamaño de la muestra

Para cumplir con los objetivos de la ENA 2008, se consideró que el tamaño de la muestra seleccionado debería permitir estimar proporciones estatales de aproximadamente 12.2%. Además, contemplando que la encuesta debería permitir obtener estimaciones estatales con error y confianza idénticos a los utilizados para el diseño

de la Encuesta Nacional de Adicciones 2002, se consideró un error relativo máximo de 15%, una confianza de 90%, una tasa de 15% de no respuesta, un efecto de diseño de 2.183 y un promedio de 1.4 individuos entrevistados por vivienda. Se determinó un tamaño de muestra estatal de aproximadamente 1 584 viviendas de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot (1-p) \cdot deff}{r^2 \cdot p \cdot TR \cdot h}$$

donde

n	Tamaño de muestra
p	Proporción a estimar
$z_{\alpha/2}$	Cuantil de una distribución normal asociado con un nivel de confianza deseado $1-\alpha$
r	Error relativo máximo que se está dispuesto a aceptar
$deff$	Efecto de diseño, que es la pérdida o ganancia en la eficiencia derivada del uso de un diseño complejo para la ENA 2008
TR	Tasa de respuesta esperada
h	Promedio de entrevistas por vivienda

El tamaño de la muestra en el ámbito nacional fue de 50 688 viviendas, a partir del cual se podrán estimar proporciones mayores o iguales a 0.43% en el ámbito nacional con la misma precisión y confianza que en las estimaciones estatales.

Esquema de selección

El diseño muestral de la ENA 2008 es probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados; para el proceso de selección, se utilizaron datos del Censo de Población y Vivienda de 2000. Ya que en los estratos I y II las localidades incluyen AGEB y en el estrato III las AGEB incluyen localidades, el esquema de selección depende del estrato que se esté observando. Así, los esquemas de selección para los estratos I y II son idénticos, mientras que el esquema para el estrato III es diferente; ambos esquemas se describen a continuación:

Estratos I y II

- En la primera etapa se seleccionaron k AGEB con probabilidad proporcional al tamaño (PPT), definido por el número de viviendas particulares habitadas en el AGEB
- Para cada una de las AGEB seleccionadas, se seleccionaron seis manzanas con probabilidad proporcional a su número de viviendas
- Posteriormente, en cada una de las manzanas seleccionadas, se realizó una selección de seis viviendas, utilizando un muestreo sistemático con arranque aleatorio
- En cada una de las viviendas seleccionadas y siempre que la composición del hogar lo permitió, es decir, que en el hogar

existieran individuos en el rango de edad, se seleccionaron un adulto y un adolescente, según las definiciones descritas anteriormente, mediante el uso de muestreo aleatorio simple. La encuesta se aplicó en todos los hogares de la vivienda

- A cada uno de los individuos seleccionados se le aplicó la entrevista siguiendo el cuestionario correspondiente

La constante k será proporcional al tamaño de muestra asignado al estrato.

Estrato III

El esquema de selección en el caso de las localidades que conforman el estrato III se describe a continuación:

- Las unidades primarias de muestreo fueron AGEB rurales, que contienen las localidades que conforman el estrato III. La probabilidad de seleccionar un AGEB fue proporcional al número de viviendas particulares habitadas en ella. Se seleccionaron tantas AGEB como viviendas particulares habitadas en el estrato
- La unidad secundaria de muestreo (USM) estuvo constituida por las localidades o grupos de localidades adyacentes, que agruparon un mínimo de 120 viviendas. Estas USM se seleccionaron con probabilidad proporcional al número de viviendas particulares habitadas que existían
- Para cada localidad o grupo de localidades seleccionadas se extrajo una muestra aleatoria sistemática de tres grupos de doce viviendas consecutivas cada uno, llamados segmentos
- En cada una de las viviendas que conformaron los segmentos seleccionados, se aplicó la encuesta en todos los hogares de la vivienda. Siempre que la composición del hogar lo permitió, se seleccionaron un adulto y un adolescente. Esta selección se realizó utilizando muestreo aleatorio simple

Logística en campo

La ENA 2008 se realizó en dos fases:

- En la primera fase (tamizaje), se elaboraron los croquis y listados de viviendas en las manzanas seleccionadas y se identificó a los residentes habituales (nombre, edad y sexo) de las viviendas seleccionadas. El primer paso consistió en aplicar el cuestionario de hogar y posteriormente se llevó a cabo la selección aleatoria de los adultos y adolescentes. En esta fase también se completó la prueba piloto
- En la segunda fase se recabó información en campo mediante la aplicación de la encuesta a los residentes previamente seleccionados

Prueba piloto

La prueba piloto tuvo como objetivo general evaluar la metodología, los procedimientos, los instrumentos y la logística de la ENA 2008 a pequeña escala. Con el fin de contar con instrumentos revisados, afinados e implementados en campo, la ENA 2008 incluyó una fase piloto que se llevó a cabo en la localidad de Texcoco, en el Estado de México del 10 al 14 de diciembre de 2007. Se seleccionaron ocho AGEB; al interior de cada una de ellas se seleccionaron dos manzanas, y ahí, se aplicó un total de cinco entrevistas por manzana, lo cual da un total de 80 viviendas seleccionadas. Se utilizaron dos equipos integrados por un jefe de grupo, cuatro entrevistadores y una persona de apoyo informático. Los resultados de la prueba piloto permitieron identificar y corregir errores en el cuestionario e implementar mejoras en el equipo de campo.

Cuestionarios de recolección de información

El cuestionario se diseñó y programó para aplicarse en computadoras *laptop*. El cuestionario incluyó dos grandes rubros de información: a) información referente a las características de la vivienda y sus residentes habituales y b) información sobre los individuos seleccionados en cada uno de los grupos de edad. El primero se administró en los hogares de la muestra en el ámbito nacional.

El informante adecuado para la sección del hogar fue el jefe de hogar, el ama de casa u otro miembro de la familia de 18 años o más sin impedimentos para poder responder y con conocimientos de las características de la vivienda y sus residentes habituales.

Los temas del cuestionario de hogar se pueden clasificar en tres rubros principales:

- Datos de identificación y de control. Se registró información referente a la ubicación de cada vivienda seleccionada: entidad, municipio, localidad, AGEB, manzana, número de vivienda, domicilio y el registro de hasta cuatro visitas del entrevistador, por informante, a fin de asentar el código de resultado definitivo en el plano individual
- Características y nivel socioeconómico del hogar. Se registró información referente al total de cuartos, el tipo de material del piso, el tipo de material de construcción de la vivienda, la disponibilidad de agua entubada, el calentador de agua, la posesión de automóvil, así como al ingreso promedio mensual familiar
- Características de los miembros del hogar. Se identificó el número de miembros del hogar y para cada uno se recabó la siguiente información: nombre (listado de personas), edad, fecha de nacimiento, sexo, parentesco con el jefe de familia, nivel de escolaridad, estado civil y ocupación

Cuestionario individual

El informante adecuado fue el individuo previamente seleccionado por el equipo de investigación encargado del diseño muestral de la ENA 2008. Se administró un solo cuestionario individual en cada hogar visitado donde hubiera por lo menos un informante elegible, esto es, una persona entre 12 y 65 años de edad cumplidos al momento de la visita. También se incluyó una sobremuestra de adolescentes entre 12 y 17 años de edad.

El cuestionario individual recabó información con respecto a los siguientes temas:

- Datos sociodemográficos del informante: sexo, edad, estado civil, escolaridad, datos sobre la familia, ocupación e ingreso familiar
- Consumo de tabaco
- Consumo de drogas
- Consumo de alcohol
- Dependencia y abuso al consumo de drogas
- Dependencia y abuso al consumo de alcohol
- Exposición al uso de drogas
- Consumo de drogas en el entorno familiar y social
- Percepción acerca de las drogas y de los usuarios
- Exposición a la prevención de drogas
- Tratamiento por consumo de drogas

El instrumento incluyó otras secciones que evaluaron aspectos de la salud mental como la sintomatología depresiva, el intento suicida y, del contexto social, la violencia de género, la conducta antisocial y la migración, además de los conocimientos y creencias sobre algunas enfermedades como el VIH/SIDA, la hepatitis y su relación con el consumo de drogas y el comportamiento sexual.

La parte principal del instrumento se aplicó al 100% de los entrevistados, y consistió hasta la sección de tratamiento y uso de servicios. Aproximadamente el 40% de los entrevistados, seleccionados aleatoriamente, contestaron las secciones adicionales que se indicaron en el párrafo anterior. Esta situación conlleva que para el análisis de estas secciones, se usa un ponderador específico, distinto del de la sección principal, para obtener resultados expandidos a nivel nacional. Esta situación refleja que al usar uno u otro ponderador, las expansiones de los grupos, sea por sexo, edad u otra variable, varíen ligeramente.

Levantamiento de la ENA 2008

La fase inicial de campo de la ENA 2008 se llevó a cabo entre abril y junio de 2008. Antes de esta fase, se llevó a cabo una capacitación en la Ciudad de México del 24 de marzo al 4 de abril, en la cual se incluyeron dos días de prueba de campo, con la participación de los casi 300 encuestadores reclutados para el proyecto.

El periodo operativo de la ENA 2008 se implementó de forma simultánea en las 32 entidades federativas, con equipos

integrados por un coordinador estatal, un supervisor y un grupo de encuestadores. Para cada vivienda seleccionada, se programaron hasta cuatro visitas, incluyendo horarios especiales (antes de las 8 am o después de las 8 pm) y fines de semana, para incrementar la probabilidad de encontrar a los ocupantes. La encuesta se aplicó con captura simultánea de datos, es decir, que se utilizaron una aplicación informática y computadoras portátiles en campo para las entrevistas. El cuestionario básico de hogar considera las características demográficas y socioeconómicas, lo que permite contar con información tanto sobre el contexto en el que ocurre el consumo de sustancias, como sobre el perfil de los consumidores y los no consumidores.

El diseño consideró la entrevista de un adulto de entre 18 y 65 años por hogar y de un adolescente de entre 12 y 17 años por hogar. La aplicación informática de la encuesta se programó para realizar una selección aleatoria del individuo o de los individuos a entrevistar a partir del listado de integrantes obtenido en el cuestionario básico de hogar. Debido a factores externos a la encuesta –relacionados con el contexto nacional y con problemas de inseguridad y climatológicos–, la tasa de respuesta de la encuesta fue menor a la esperada, lo que se tradujo en un número menor del necesario de entrevistas individuales completas para las estimaciones deseadas.

Debido a ello, posterior al término del periodo operativo inicial, se llevó a cabo uno especial de recuperación de entrevistas individuales en un conjunto de 11 entidades; éste se implementó entre julio y agosto de 2008. Adicionalmente, se tomó la decisión de elaborar una muestra más para 21 estados, de forma que se pudiera contar con observaciones suficientes para los análisis propuestos para la ENA 2008. El componente operativo para esta muestra adicional se implementó entre septiembre y octubre de 2008. Ambos operativos adicionales siguieron los procedimientos y estructura utilizados para el original.

Puebla fue una de las entidades cuya muestra se cubrió en dos etapas. En la primera se visitaron 1 455 hogares y se entrevistó a 1 085 individuos, mientras que en la segunda fueron 204 los hogares y 145 los individuos encuestados. Las tasas de respuesta en la primera y segunda etapas fueron de 76.3% y 83.3%, respectivamente. La tasa global fue de 77.1 por ciento.

Supervisión del periodo operativo

La estructura de campo se integró con un coordinador nacional, un subcoordinador nacional, 32 coordinadores estatales, 32 supervisores y siete entrevistadores por estado. Los coordinadores estatales y los supervisores fueron los encargados de la supervisión directa de las entrevistas y de la correcta ubicación de las viviendas.

El trabajo de supervisión se diseñó con base en las dos fases siguientes:

- Planeación y organización. En esta etapa, el supervisor de campo agrupó zonas o áreas de trabajo colindantes para optimizar el tiempo de levantamiento y asignó las cargas de trabajo a cada entrevistador a su cargo.
- Supervisión en campo. En esta etapa, el supervisor controló el levantamiento de la información, retroalimentó a los

entrevistadores con respecto a las dudas o problemas surgidos durante el levantamiento, así como respecto a los lineamientos de la capacitación. También verificó que los individuos y los hogares entrevistados fueran los seleccionados, observó directamente una de cada cuatro entrevistas en su área de responsabilidad y confirmó 100% de los códigos de no respuesta.

Adicionalmente, la coordinación nacional de la encuesta en el INSP monitorizó regularmente las actividades en cada estado y, a partir de los informes recibidos –tanto internos como de las supervisiones del personal del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz– envió precisiones sobre la aplicación de los instrumentos o actividades del operativo. Se requirió que los coordinadores estatales informaran sobre el desempeño de cada uno de los encuestadores y verificaran las causales de no entrevista de las viviendas. Adicionalmente, el área responsable en el INSP envió supervisión con personal independiente del operativo para recontactar viviendas visitadas por entrevistadores con baja detección de casos de consumo y verificar la realización de las re-entrevistas.

Supervisión externa ENA 2008

Para garantizar la calidad en los procesos de recopilación de la información en campo y la validez de la propia información, el INSP contrató una empresa para realizar una supervisión externa (SE) a sus procesos de recopilación de información en campo durante el periodo operativo de la encuesta. El objetivo de la SE fue medir la calidad de información en una submuestra de aproximadamente 10% del universo de viviendas de la ENA. El interés del equipo de investigadores de la ENA 2008 fue generar informes sobre procesos de recolección de información por parte de los entrevistadores

en campo y contar con los parámetros que permitieran determinar la validez y la confiabilidad de la información recolectada en campo. El INSP, en colaboración con el INPRFM, diseñó un cuestionario *ad hoc*; el formato de aplicación fue cara a cara y la duración de las entrevistas, fue de aproximadamente 15 minutos. El número estimado de entrevistas fue de 156 por entidad, de las cuales aproximadamente 70% se recabó en zonas urbanas y 30%, en zonas rurales.

La empresa ganadora llevó a cabo un proceso de capacitación en el cual participaron miembros del equipo de investigación del INSP con el fin de resolver dudas sobre temas conceptuales; además, se discutieron los objetivos de la ENA 2008 (mediante el uso de manuales y cuestionarios) y la importancia de contar con una supervisión externa. Durante el proceso de levantamiento en campo de la SE, se entregaron al INSP informes semanales de las incidencias detectadas y se registraron incidentes o situaciones que dificultaban el trabajo en campo. El informe final de la supervisión externa constituye un documento que registra el proceso de recolección de información de la ENA 2008 en la submuestra seleccionada.

Consideraciones éticas

Todos los participantes leyeron (o les fue leída, en caso necesario) una carta de consentimiento informado. Se recabó información solamente de quienes aceptaron participar y firmaron la carta correspondiente.

En el caso de los menores de edad, los padres o tutores firmaron una carta de asentimiento previo a que el menor proporcionara la información requerida por la encuesta. Se hizo énfasis en el carácter voluntario de la participación, así como en el carácter confidencial de la información.

tabaco

Principales resultados

¿Ha fumado alguna vez en la vida, aunque sea una sola fumada?

La pregunta ¿Ha fumado alguna vez en la vida, aunque sea una sola fumada? tiene como objetivo estimar la prevalencia de vida (*lifetime prevalence*) del consumo de tabaco en la población. Bajo esta definición, se encontró que 41.1% de la población poblana entre 18 y 65 años, cerca de 1 millón 263 mil personas, había probado alguna vez en su vida el cigarrillo. El 60.8% de los hombres y el 24.3% de las mujeres respondieron afirmativamente a esta pregunta (cuadro 1).

Edad de consumo de tabaco por primera vez

La edad promedio de inicio de consumo de tabaco en la población de 18 a 65 años del estado de Puebla es de 18.3 años (IC95% 17.6–18.9).

Razones de inicio de consumo de tabaco

Las dos razones más importantes para el inicio del consumo de tabaco fueron la curiosidad y la convivencia con fumadores. El 57.2% de los fumadores (57% de los hombres y 57.5% de las mujeres) iniciaron el consumo de tabaco por curiosidad, mientras que 30 y 27.4% de los hombres y mujeres que fuman comenzaron a hacerlo por convivencia con familiares, amigos o compañeros fumadores (cuadro 2).

¿Ha fumado más de 100 cigarrillos (5 cajetillas) en la vida?

La pregunta ¿Ha fumado más de 100 cigarrillos (5 cajetillas) en la vida? tiene como objetivo estimar la prevalencia de consumo de tabaco en la población. Por muchos años ésta fue la pregunta utilizada para la estimación de la prevalencia, en concordancia con la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al usar esta definición, se encontró que 14.8% de la población en el rango en estudio, cerca de 453 mil poblanos, había fumado más de 100 cigarrillos en su vida (cuadro 3). Desde el punto de vista epidemiológico (estimación de

prevalencias de fumadores, ex fumadores y nunca fumadores), esta definición sobreestima el consumo de tabaco en los adultos. Por esta razón y debido que la epidemia de tabaquismo es un problema de salud pública global y cambiante, que requiere de indicadores válidos y precisos para la vigilancia epidemiológica y la evaluación del cumplimiento de políticas y estrategias de control del tabaco, esta definición dejó de ser utilizada.

Fumador activo, ex fumador y nunca ha fumado

Para caracterizar la población mexicana respecto al consumo de tabaco, se utilizaron las siguientes definiciones:

- Fumador activo: persona que contestó haber fumado alguna vez en la vida y haber fumado durante el último año
- Ex fumador: persona que contestó haber fumado alguna vez en la vida y haber dejado de fumar hace más de un año
- Nunca ha fumado: persona que contestó no haber fumado en la vida

Mediante el uso de estas definiciones se encontró que, entre los pobladores de 18 a 65 años de Puebla, 20.6% eran fumadores activos, lo que representa cerca de 633 mil fumadores en el estado. La comparación de la prevalencia de consumo de tabaco estatal con el promedio nacional (20.6%) se puede observar en la figura 1. El 20.5% de los encuestados refirieron ser ex fumadores y el 58.9% no había fumado. El consumo de tabaco en los hombres fue de 35.4% y de 8% en las mujeres (cuadro 4).

Fumadores activos

Edad de inicio del consumo diario de cigarrillos

En Puebla, los fumadores activos de 18 a 65 años inician el consumo diario de cigarrillos, en promedio, a los 17.3 años (IC95% 16.5–18.1). Los hombres a los 17 años y las mujeres a los 21 años.

Cuadro 1

Respuesta a la pregunta ¿Ha fumado alguna vez en su vida?, según sexo. Adultos de 18 – 65 años. Puebla, México, 2008

		Sexo		Total	
		Hombre	Mujer		
No		N*	555,2	1254,5	1809,7
	IC95 %	L. Inferior	451,0	1109,7	1648,1
		L. Superior	659,4	1399,2	1971,3
		%	39,2	75,7	58,9
	IC95 %	L. Inferior	34,2	70,1	55,2
L. Superior		44,5	80,5	62,5	
Sí		N*	859,9	403,2	1263,1
	IC95 %	L. Inferior	764,1	316,2	1136,0
		L. Superior	955,6	490,2	1390,2
		%	60,8	24,3	41,1
	IC95 %	L. Inferior	55,5	19,5	37,5
L. Superior		65,8	29,9	44,8	
Total		N*	1415,1	1657,7	3072,8

*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro 2

Razón por la que empezó a fumar según sexo. Adultos de 18 – 65 años. Puebla, México, 2008

		Sexo		Total	
		Hombre	Mujer		
Porque su familia, amigos o compañeros fumaban		N*	257,2	110,5	367,7
	IC95%	L. Inferior	194,4	59,2	287,4
		L. Superior	320,0	161,7	448,0
		%	30,0	27,4	29,2
	IC95%	L. Inferior	23,3	18,1	23,3
L. Superior		37,7	39,2	35,9	
Por curiosidad		N*	488,5	231,9	720,3
	IC95%	L. Inferior	400,2	167,7	606,0
		L. Superior	576,8	296,0	834,7
		%	57,0	57,5	57,2
	IC95%	L. Inferior	49,0	47,8	50,5
L. Superior		64,7	66,7	63,6	
Otra razón		N*	110,6	60,9	171,5
	IC95%	L. Inferior	56,0	36,7	109,3
		L. Superior	165,2	85,0	233,7
		%	12,9	15,1	13,6
	IC95%	L. Inferior	8,0	10,1	9,7
L. Superior		20,1	22,0	18,8	
Total		N*	856,3	403,2	1259,5

*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro 3

¿Ha fumado más de 100 cigarrillos (5 cajetillas) en la vida según?, sexo. Adultos de 18 – 65 años. Puebla, México, 2008


		Sexo			
		Hombre	Mujer	Total	
No	N*	1035,0	1583,9	2618,9	
	IC95%	L. Inferior	899,2	1447,1	2455,0
		L. Superior	1170,8	1720,7	2782,8
	%	73,1	95,6	85,2	
	IC95%	L. Inferior	68,2	93,4	82,8
L. Superior		77,6	97,0	87,4	
Sí	N*	380,1	73,7	453,8	
	IC95%	L. Inferior	311,1	44,7	377,9
		L. Superior	449,2	102,7	529,8
	%	26,9	4,4	14,8	
	IC95%	L. Inferior	22,4	3,0	12,6
L. Superior		31,8	6,6	17,2	
Total	N*	1415,1	1657,7	3072,8	

*N en miles.

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Figura 1

Prevalencia de fumador activo.
Adultos de 18 - 65 años.
Puebla, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Consumo diario de cigarrillos (cantidad y duración)

Los fumadores activos entre 18 y 65 años en Puebla fuman, en promedio, cinco cigarrillos al día (IC95% 3-7), con un tiempo promedio de fumar diariamente de 8.5 años (IC95% 6.5-10.4). El 89.3% de los fumadores activos consume menos de 16 cigarrillos al día, 9.7% de 16 a 25 cigarrillos y 1% más de 26 cigarrillos.

Adicción

Algunas de las características de los fumadores activos (aquellos que fumaron cigarrillos durante el último año) en la población entre 18 y 65 años residente en Puebla, son las siguientes: 57% le dan el golpe al cigarro algunas veces o siempre; 7.9% fuman el primer cigarro del día durante la primera media hora después de levantarse; el periodo en el que fuman con mayor frecuencia, en 96.6% de los casos, es en el transcurso de la tarde y la noche.

Estrategias para dejar de fumar

A los fumadores activos entre 18 y 65 años se les solicitó información sobre dejar de fumar. Sobre esto 10.1% contestó que les sería difícil abstenerse de fumar en lugares públicos, y 60.2% que han intentado dejar de fumar alguna vez. Las principales formas en que lo hicieron fueron: dejar de fumar súbitamente (63.8%); dejar de comprar cigarrillos (15.5%); sustituir fumar por otra actividad (9%); y disminuir gradualmente el número de cigarrillos (5.9%). Únicamente 2.4% se ha sometido a algún tratamiento para dejar de fumar.

Cuadro 4

Fumador activo, ex fumador y nunca ha fumado según sexo. Adultos de 18 – 65 años. Puebla, México, 2008

		Sexo		Total	
		Hombre	Mujer		
Nunca ha fumado	N*	555,2	1254,5	1809,7	
	IC95%	L. Inferior	451,0	1109,7	1648,1
		L. Superior	659,4	1399,2	1971,3
		%	39,2	75,7	58,9
	IC95%	L. Inferior	34,2	70,1	55,2
L. Superior		44,5	80,5	62,5	
Fumador actual***	N*	500,8	132,6	633,4	
	IC95%	L. Inferior	416,7	90,1	532,1
		L. Superior	584,9	175,0	734,7
		%	35,4	8,0	20,6
	IC95%	L. Inferior	30,2	5,8	17,9
L. Superior		41,0	11,0	23,6	
Ex fumador	N*	359,0	270,6	629,7	
	IC95%	L. Inferior	283,9	205,3	536,0
		L. Superior	434,2	335,9	723,4
		%	25,4	16,3	20,5
	IC95%	L. Inferior	20,8	12,8	17,5
L. Superior		30,6	20,5	23,9	
Total	N*	1415,1	1657,7	3072,8	

*N en miles

** Fumó en el último año

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

El 75.8% de los fumadores activos entre 18 y 65 años ha escuchado hablar sobre algún medicamento que ayuda a dejar de fumar. De ellos, 58% está de acuerdo en que si decidieran dejar de fumar, las medicinas (chicles y parches con nicotina o bupropión) les ayudarían a hacerlo; 45.5% opinaron que dichas medicinas son muy caras; 39.6% contestaron que estas medicinas pueden dañar su salud; 18.7% respondieron que son muy difíciles de conseguir. Finalmente, 87.6% mencionó que si decidiera dejar de fumar, podría hacerlo sin la ayuda de las mencionadas medicinas (cuadro 5).

Ex fumadores

En Puebla, 20.5% de la población entre 18 y 65 años, cerca de 629 mil personas, refirieron ser ex fumadores. La edad promedio en la que los adultos que, habiendo fumado alguna vez en su vida y que al momento de la encuesta se consideraban ex fumadores dejaron de fumar, fue a los 27.2 años; a los 28.7 años para el caso de los hombres y a los 24.8 para las mujeres. Estos ex fumadores fumaban, en promedio, cuatro cigarrillos al día: 5 y 2 los hombres y las mujeres, respectivamente. Las principales razones por las que los ex fumadores dejaron de fumar fueron: por conciencia del daño a la salud (31.7%) y porque se hartaron de fumar (35.1%). Estas proporciones fueron semejantes entre hombres y mujeres.

Nunca han fumado

El 58.9% de la población (39.2% de los hombres y 75.7% de las mujeres) entre 18 y 65 años del estado de Puebla refirió no haber fumado.

Exposición al humo de tabaco ambiental (HTA)

El 23.9% de los encuestados que nunca han fumado, representativos de cerca de 585 mil poblanos, reportaron estar expuestos al HTA; así lo expresaron 22.1% de los hombres y 24.9% de las mujeres en esta categoría, mientras que 29.1% de los adolescentes, equivalente a cerca de 186 mil adolescentes en el estado, reportaron estar expuestos al HTA (cuadro 6).

Percepción de las políticas de control del tabaco

En cuanto a la opinión que los participantes de esta encuesta expresaron sobre las medidas de protección a la salud relativas al establecimiento de espacios libres de humo de tabaco en lugares públicos, estuvieron completa o medianamente a favor de que fueran establecidas: en los restaurantes y otros lugares en donde se expendían alimentos, 90.9%, en cines y otros lugares de espectáculos, 89.3%; en bares y otros luga-

Cuadro 5

Opinión de los fumadores activos sobre los medicamentos para dejar de fumar. Adultos de 18 - 65 años. Puebla, México, 2008

	N*	IC95%		%	IC95%		
		L. Inferior	L. Superior		L. Inferior	L. Superior	
Si decidiera fumar, estas medicinas le ayudarían a hacerlo							
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	278,2	204,9	351,4	58,0	47,5	67,8	
Complemento	201,8	147,2	256,5	42,0	32,2	52,5	
Las medicinas para dejar de fumar son carísimas							
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	218,2	163,4	272,9	45,5	35,7	55,6	
Complemento	261,8	190,7	332,9	54,5	44,4	64,3	
Las medicinas para dejar de fumar pueden dañar su salud							
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	190,1	127,2	253,1	39,6	29,3	50,9	
Complemento	289,9	220,3	359,4	60,4	49,1	70,7	
Si decidiera dejar de fumar, podría hacerlo sin estas medicinas							
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	420,6	345,6	495,5	87,6	81,4	92,0	
Complemento	59,4	32,6	86,2	12,4	8,0	18,6	
Las medicinas para dejar de fumar son muy difíciles de conseguir							
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	89,6	50,8	128,4	18,7	11,9	28,1	
Complemento	390,4	308,5	472,3	81,3	71,9	88,1	
Total	480,0	400,2	559,8	100,0			

*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro 6

Exposición a humo de tabaco ambiental, según sexo y grupos de edad. Puebla, México, ENA 2008

		Sexo		Grupos de edad			
		Hombre	Mujer	Adolescentes	Adultos	Total	
No	N*	665,1	1200,2	454,3	1411,1	1865,3	
	IC95%	L. Inferior	544,6	1042,6	374,5	1254,6	1658,6
		L. Superior	785,7	1357,8	534,0	1567,5	2072,0
		%	77,9	75,1	70,9	78,0	76,1
	IC95%	L. Inferior	71,0	70,2	63,6	73,0	72,0
L. Superior		83,6	79,5	77,2	82,2	79,8	
Sí	N*	188,3	396,9	186,6	398,6	585,2	
	IC95%	L. Inferior	129,7	316,2	139,1	310,2	487,0
		L. Superior	246,9	477,5	234,1	487,1	683,4
		%	22,1	24,9	29,1	22,0	23,9
	IC95%	L. Inferior	16,4	20,5	22,8	17,8	20,2
L. Superior		29,0	29,8	36,4	27,0	28,0	
Total	N*	853,5	1597,1	640,9	1809,7	2450,5	

*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

res en donde se venden bebidas con alcohol, 68%; en hospitales y otros centros de atención a la salud, 95.4%; en lugares de trabajo, 91.2%; en el transporte público, 92.1%. El 95.4% estuvo completa o mediana-

mente a favor de que debería prohibirse el consumo de tabaco en cualquier lugar cerrado. Proporciones semejantes se obtienen al estratificar por edad, es decir, entre los adolescentes y los adultos (cuadro 7).

Cuadro 7

Percepción sobre medidas de protección a la salud en lugares públicos, según grupos de edad. Puebla, México, 2008

	N*	IC95%		%	IC95%	
		L. Inferior	L. Superior		L. Inferior	L. Superior
Adolescentes						
En los restaurantes y otros lugares en donde se expenden alimentos						
Completamente a favor/medianamente a favor	701,5	619,5	783,6	92,5	88,6	95,1
Complemento	57,0	30,1	83,9	7,5	4,9	11,4
En cines y otros lugares de espectáculos						
Completamente a favor/medianamente a favor	696,5	611,6	781,4	91,8	88,1	94,4
Complemento	62,1	36,5	87,6	8,2	5,6	11,9
En bares y otros lugares en donde se venden bebidas con alcohol						
Completamente a favor/medianamente a favor	539,4	458,1	620,6	71,1	64,6	76,8
Complemento	219,2	166,3	272,1	28,9	23,2	35,4
En hospitales y otros centros de atención a la salud						
Completamente a favor/medianamente a favor	712,5	630,0	794,9	93,9	90,7	96,1
Complemento	46,1	23,9	68,2	6,1	3,9	9,3
En lugares de trabajo						
Completamente a favor/medianamente a favor	692,7	607,9	777,6	91,3	88,4	93,6
Complemento	65,8	44,2	87,4	8,7	6,4	11,6
En el transporte público						
Completamente a favor/medianamente a favor	705,4	616,6	794,1	93,0	89,4	95,4
Complemento	53,2	29,7	76,6	7,0	4,6	10,6
Debería prohibirse el consumo de tabaco en cualquier lugar cerrado						
Completamente a favor/medianamente a favor	732,3	638,1	826,5	96,5	93,8	98,1
Complemento	26,2	11,1	41,4	3,5	1,9	6,2
Total	758,5	666,4	850,7	100,0		
Adultos						
En los restaurantes y otros lugares en donde se expenden alimentos						
Completamente a favor/medianamente a favor	2781,0	2602,4	2959,7	90,5	87,9	92,6
Complemento	291,7	219,2	364,3	9,5	7,4	12,1
En cines y otros lugares de espectáculos						
Completamente a favor/medianamente a favor	2724,3	2536,8	2911,7	88,7	85,9	91,0
Complemento	348,5	271,5	425,5	11,3	9,0	14,1
En bares y otros lugares en donde se venden bebidas con alcohol						
Completamente a favor/medianamente a favor	2067,0	1891,0	2243,1	67,3	63,4	71,0
Complemento	1005,7	881,9	1129,5	32,7	29,0	36,6
En hospitales y otros centros de atención a la salud						
Completamente a favor/medianamente a favor	2942,6	2762,8	3122,4	95,8	93,5	97,3
Complemento	130,2	74,2	186,1	4,2	2,7	6,5
En lugares de trabajo						
Completamente a favor/medianamente a favor	2800,6	2617,3	2984,0	91,1	88,6	93,2
Complemento	272,1	201,9	342,3	8,9	6,8	11,4
En el transporte público						
Completamente a favor/medianamente a favor	2823,4	2633,5	3013,2	91,9	89,4	93,8
Complemento	249,4	183,6	315,2	8,1	6,2	10,6
Debería prohibirse el consumo de tabaco en cualquier lugar cerrado						
Completamente a favor/medianamente a favor	2921,2	2733,1	3109,3	95,1	92,6	96,7
Complemento	151,6	90,9	212,2	4,9	3,3	7,4
Total	3072,8	2896,8	3248,7	100,0		

*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Conclusiones

En el ámbito nacional, en la población de 18 a 65 años se encontró que 20.6% de la población era fumadora activa (31.3% de los hombres y 10.9% de las mujeres); 19.6% eran ex fumadores (24.3% de los hombres y 15.3% de las mujeres), y 59.8% nunca habían fumado (44.4% de los hombres y 73.9% de las mujeres).

En Puebla se encontró que los fumadores activos constituían 20.6% de la población (cerca de 633 mil personas), siendo esta prevalencia igual al promedio nacional. Los fumadores activos iniciaron el consumo diario de cigarrillos a los 17.3 años, fuman en promedio cinco cigarrillos diarios y 7.9% de ellos fuman el primer cigarro del día durante la primera media hora después de levantarse.

El 20.5% de la población en el rango estudiado, cerca de 629 mil, son ex fumadores y la razón más importante por la que dejaron

de fumar fue la conciencia por los daños a la salud que provoca el consumo de tabaco.

El 58.9% de este sector poblacional, cerca de 1 millón 809 mil personas, refirió nunca haber fumado. Sin embargo, de este grupo 22% de los adultos, cerca de 398 mil, y 29.1% de los adolescentes, cerca de 187 mil, reportaron estar expuestos al humo de tabaco ambiental.

La opinión de los habitantes de Puebla acerca del establecimiento de espacios libres de humo de tabaco en lugares públicos es de apoyo, pues más de 95% de los adultos y adolescentes estuvo completa o medianamente a favor de que debería prohibirse el consumo de tabaco en cualquier lugar cerrado.

drogas

Principales resultados

Los resultados en el estado de Puebla muestran que la exposición al consumo de drogas (que les hayan regalado o intentado vender drogas) es menor que en el promedio nacional. Al comparar la exposición en el estado con la nacional, para los hombres, la razón es de 1.2 hombres en el ámbito nacional por cada 1 en el estado y en las mujeres es de 1.8 nacional por 1 estatal.

Como en los resultados nacionales, más hombres (25.0%) que mujeres (4.5%) están expuestos.

Esto se refleja en las prevalencias del consumo global de drogas (sin incluir tabaco ni alcohol), en donde se observa que el consumo es menor al promedio nacional, tanto en hombres como en mujeres (figura 1).

Una situación similar ocurre para las drogas ilegales, en donde el consumo en Puebla también es menor al promedio nacional, en 3.0% en el caso de los hombres y 0.7% en las mujeres (figura 2).

Para las drogas médicas, también se observa menor consumo en el estado, tanto en hombres como en mujeres.


Esto es similar para algunas drogas específicas. El consumo de marihuana y cocaína es menor en el estado, en comparación con el promedio nacional, tanto en hombres como en mujeres; sin embargo, el consumo de metanfetaminas en las mujeres es igual al promedio nacional y en el caso de los hombres está debajo (figura 3).

Adicional a lo señalado anteriormente, en todos los casos, el consumo de estas drogas es mayor en los hombres en comparación con las mujeres.

Los datos de la encuesta permiten aproximarnos a la demanda de necesidades de atención de la población total, de manera que en lo alto de la pirámide de atención se observa que 0.2% de ella presenta dependencia, que corresponde a 7,788 personas en el estado.

Al analizar otros aspectos sobre el consumo de drogas, casi dos terceras partes de los hombres y las mujeres señalan que el número de usuarios se ha incrementado en los últimos cinco años en el país.


Figura 1
Exposición y consumo de drogas, según sexo. Puebla, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Figura 2


Consumo de drogas médicas e ilegales, según sexo. Puebla, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Figura 3

Consumo de marihuana, cocaína y metanfetaminas, según sexo. Puebla, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

De la misma forma, prevalece la concepción de que el adicto a las drogas es alguien que necesita ayuda (63.9%) y es una persona enferma (57.3%); mientras que una muy baja proporción considera que es alguien egoísta (10.2%) o que es independiente (6.1%).

En cuanto a qué hacer para rehabilitar a las personas adictas a las drogas, una parte importante de la gente señala que deben ser enviadas a granjas especiales fuera de la ciudad (40.3%).

Con relación a la percepción de qué tan adictivas son las drogas, el alcohol (71.0%), la cocaína (70.5%) y la marihuana (68.8%) son las que señalan en el estado como las de mayor potencial adictivo.

Al analizar algunas de las características de quiénes usan drogas, especialmente en la población de 12 a 25 años, se observa que principalmente son personas que ya no están estudiando, que se encuentran trabajando o recibiendo algún salario que les permite comprarla y que están viviendo sólo con su mamá, además de que en el entorno social en que se mueven hay personas que consumen drogas.

Conclusiones

Los resultados muestran que en el estado el consumo de drogas médicas e ilegales es menor, en general, que el promedio nacional, en ambos sexos, especialmente de marihuana y la cocaína. En el estado, el porcentaje de personas dependientes al consumo de drogas es de 0.2%, debajo del promedio nacional de 0.6%.

También se muestra que hay una menor exposición a la oportunidad de consumo en el estado, tanto en hombres como en mujeres.

De la misma forma, en la población más joven, quienes ya no estudian, se encuentran trabajando o que sólo viven con su mamá, son quienes están más expuestos y consumen en mayor proporción

drogas. Ello refuerza el valor protector no sólo de la asistencia a la escuela, sino de la importancia de dotar de estrategias académicas que permitan experimentar el éxito escolar. En el ámbito familiar, es importante trabajar con los padres en estrategias parentales efectivas.

Estos datos son concordantes con los señalados por las fuentes descritas en la introducción de este documento, que indican un incremento en el consumo de sustancias en este estado. El consumo de marihuana y de cocaína como los principales elementos para asistir a tratamiento se relaciona directamente con el mayor consumo de dichas sustancias en el estado.

alcohol

Principales resultados

Al considerar el consumo diario de alcohol, en hombres (1.5%) es igual a la media nacional, a diferencia de las mujeres (0.4%) en donde es significativamente mayor que el promedio del país.


En cuanto al consumo alto, los hombres (45.9%) se encuentran arriba del promedio nacional, en tanto las mujeres (14.9%) se mantienen dentro del promedio (figura 1).

Para el consumo consuetudinario, en los hombres (7.1%) se observa un consumo debajo del promedio nacional, lo cual también ocurre en el caso de las mujeres (1.2%) (figura 2).

Finalmente, en relación con el abuso/dependencia, en el estado se encuentra que para los hombres (14.8%) el porcentaje está arriba del promedio y en las mujeres (1.4%) es ligeramente menor que el promedio nacional.

Figura 1


Consumo diario y alto de alcohol según sexo. Puebla, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Figura 2

Consumo consuetudinario y abuso/dependencia de alcohol, según sexo. Puebla, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Conclusiones

En el caso de alcohol, en general el consumo es cercano al promedio y en algunos casos es mayor en el estado que a nivel nacional, sólo en abuso/dependencia, las mujeres están debajo del promedio nacional, así también, en el consumo consuetudinario tanto hombres como mujeres están debajo del promedio nacional.

Bajo este contexto, es importante canalizar mayores esfuerzos a la prevención primaria del problema, en los distintos segmentos de la sociedad, con la intención de disminuir la problemática y, de manera

especial, trabajar con la población infantil, a fin de dotar a esta comunidad de mejores estrategias para enfrentar la problemática y tener mejores oportunidades de vida.

El incremento en el número de usuarios fuertes y los problemas asociados, indica la necesidad prioritaria de atender adecuadamente y con estrategias efectivas a quienes se encuentran en el proceso de adicción al consumo.

referencias y glosario

Referencias

1. Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Instituto Mexicano de Psiquiatría. Primera Encuesta Nacional de Adicciones. México: SS, 1998.
2. Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología. Segunda Encuesta Nacional de Adicciones. México: SS, 1993.
3. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, Instituto Mexicano de Psiquiatría, Dirección General de Epidemiología, Consejo Nacional Contra las Adicciones. Tercera Encuesta Nacional de Adicciones. México: SS, 1998.
4. Secretaría de Salud, Consejo Nacional contra las Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Dirección General de Epidemiología, Instituto Nacional Estadística, Geografía e Informática. Cuarta Encuesta Nacional de Adicciones. México: SS, 2002.
5. Villatoro J, Gutiérrez M, Quiroz N, Moreno M, Gaytán L, Gaytán F *et al.* Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes 2006. México DF: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 2007.
6. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Centros de Tratamiento no Gubernamentales. Informe Anual (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) México: SS, Dirección General de Epidemiología. Disponible en: <http://www.dgepi.salud.gob.mx/infoepi/index.htm>.
7. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Centros de Integración Juvenil. Informe Anual (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). México: SS, Dirección General de Epidemiología. Disponible en: <http://www.dgepi.salud.gob.mx/infoepi/index.htm>.
8. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Consejo Tutelar para Menores. Informe Anual (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). México: SS, Dirección General de Epidemiología. Disponible en: <http://www.dgepi.salud.gob.mx/infoepi/index.htm>.
9. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones. Informe Anual (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). México: SS, Dirección General de Epidemiología. Disponible en: <http://www.dgepi.salud.gob.mx/infoepi/index.htm>.

Tabaco

Adolescente: en la encuesta, persona de 12 a 17 años de edad.

Adulto: en la encuesta, persona de 18 a 65 años de edad.

Ex fumador: persona que al momento de la entrevista refirió haber dejado de fumar cigarros hace más de un año.

Fumador actual: persona que al momento de la entrevista refirió haber fumado cigarros al menos una vez durante el año previo a la entrevista.

Fumador pasivo: persona que refirió nunca haber fumado, que convive a diario con al menos una persona que fuma cigarros en su casa, en el salón de clases o en su trabajo.

Localidad rural: localidad con menos de 2 500 habitantes.

Localidad urbana: localidad con 2 500 habitantes o más.

Nunca fumador: persona que al momento de la entrevista refirió nunca haber fumado cigarros en su vida.

Drogas

Drogas ilegales: las drogas consideradas como ilegales son: marihuana, cocaína, pasta de cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, heroína o estimulantes tipo anfetamínico (metanfetaminas).

Drogas médicas: son aquellas sustancias que se prescriben médicamente, como los opiáceos, tranquilizantes, sedantes, barbitúricos o anfetaminas. Para considerarse como consumo para drogarse, el uso se debe dar fuera de o en mayor tiempo al prescrito por el médico.

Incidencia acumulada: se refiere a la prevalencia global de consumo.

Consumo en los últimos 12 meses: consumo de alguna sustancia en los últimos 12 meses; también se le conoce como prevalencia anual.

Consumo en los últimos 30 días: Consumo de alguna sustancia en los últimos 30 días; también se le conoce como prevalencia actual.

Índice de continuidad: es el porcentaje obtenido de dividir el número de usuarios del último año entre el número de usuarios que han consumido alguna vez.

Formas de uso: vía de utilización de las distintas drogas ilegales. En el cuestionario se les pregunta si las usaron en forma inyectada, inhalada, aspirada, fumada, tomada, tragada o comida.

Uso de servicios: se refiere a que la población acude en búsqueda de apoyo para sus problemas de salud. En el caso de esta encuesta se les pregunta si han solicitado ayuda por el consumo de alguna de las drogas en los siguientes lugares: hospital general o centro comunitario, hospital o servicio psiquiátrico, médicos privados, sacerdotes, curanderos, grupo de Alcohólicos Anónimos u otros.

Mariguana regalada o comprada: se refiere a los individuos a los que les han ofrecido esta sustancia regalada o para su compra.

Cualquier droga regalada o comprada: se refiere a los individuos a los que les han ofrecido cualquier droga, sea regalada o para su compra.

Otra droga regalada o comprada: se refiere a los individuos a los que les han ofrecido cualquier droga, a excepción de la marihuana, sea regalada o para su compra.

Índice de exposición a drogas: es la oportunidad que tienen los sujetos de usar alguna droga debido a que se la han ofrecido regalada o comprada.

Consumo experimental: es cuando una persona reporta haber usado entre una y cinco veces una o más sustancias.

Consumo regular: es cuando una persona reporta haber usado una o más sustancias en más de cinco ocasiones.

Dependencia a drogas: es cuando una persona reporta haber tenido tres o más síntomas de dependencia asociados a su consumo.

Remisión por uso de drogas: se refiere a cuando una persona asistió a tratamiento debido a su consumo de drogas.

Uso dada la oportunidad: se refiere a las personas que consumen drogas y que reportaron que previamente se les había ofrecido alguna sustancia.

Dependencia dado el abuso: se refiere a las personas que reportaron haber usado una o más sustancias en más de cinco ocasiones y además presentan dependencia a las drogas.

Remisión dado el abuso: se refiere a las personas que asisten a tratamiento debido a su abuso de drogas.

Remisión dada la dependencia: se refiere a las personas que asisten a tratamiento debido a su dependencia hacia las drogas.

Necesidades de atención por uso de drogas: se toman cuatro valores, el de mayor problema es el de dependencia a las drogas, el segundo valor es el de uso sin dependencia, seguido por exposición a drogas sin consumo y finalmente el no consumo.

Alcohol

Consumo diario: Consumir diariamente al menos una copa de una bebida con contenido de alcohol.

Bebedores altos: Aquellas personas que por lo menos alguna vez en su vida han consumido cinco copas o más en una sola ocasión, para los hombres, o cuatro copas o más en una sola ocasión, para las mujeres.

Abuso/dependencia al alcohol: Se refiere a una concepción amplia que incluye la presencia de distintos problemas en el área interpersonal, social y laboral, además de algunas manifestaciones físicas, cognitivas y del comportamiento, que llevan al individuo a un malestar significativo. El criterio de abuso/dependencia se cumple si al menos tres o más de los síntomas de este consumo problemático, o al menos uno de abuso, están presentes en algún momento repetitivamente dentro de los últimos 12 meses.

Equivalencias de bebidas alcohólicas: Para efectos de establecer el patrón de consumo y el consumo per cápita, se consideran las siguientes equivalencias:

Un trago o copa es igual a:

1 lata o botella mediana de cerveza (330 ml)

1 jarro o jícara de pulque de 500 ml

1 vaso de 120 ml de vino de mesa

1 vaso o copa de destilados: brandy, ron, whisky, vodka, ginebra (30 ml)

1 botella "coolers" de vino (300 ml)

1 copa "farolazo" (30 ml)

Necesidades de atención por consumo de alcohol: Se toman cuatro valores, el de mayor problema es el de abuso/

dependencia al alcohol, el segundo valor es el de presentar algún problema de abuso/dependencia, sin que reúna el criterio de abuso/dependencia completo. El tercer valor de riesgo consiste en haber consumido cinco copas (hombres) o cuatro copas (mujeres) alguna vez en la vida, sin incluirse en las categorías anteriores. Finalmente, la cuarta categoría corresponde a quienes no han consumido alcohol o que su consumo ha sido muy bajo.

Conceptos de metodología

Estudios epidemiológicos: Una visión global del problema se obtiene utilizando diferentes estrategias que permiten conocer la extensión y magnitud del consumo en diferentes grupos de población; para interpretar sus resultados es necesario que se tome en cuenta sus características propias, ventajas y desventajas. Los porcentajes de consumo que se anexan en la sección de antecedentes y que provienen de estas dos fuentes no son estrictamente comparables. Permiten sin embargo determinar si han existido cambios en los índices con el tiempo, en las diferencias por sexo o por tipo de droga. Los siguientes apartados guían al lector sobre los diferentes estudios que se citan en la sección de antecedentes en cada estado, a fin de facilitar su lectura adecuada.

Encuestas en población escolar sobre adicciones: Las encuestas de escuelas tienen la ventaja de ser autoaplicables. Las encuestas que se citan en la sección de antecedentes se aplicaron en forma colectiva sin identificar al sujeto, la última unidad de análisis es el grupo escolar y sólo participa un encuestador/a por grupo sin la presencia de maestros/as o autoridades de la escuela. El método facilita las respuestas de los/as estudiantes y regularmente se obtienen resultados más elevados que en las encuestas en hogares. Tienen como desventaja el excluir a la población joven que ya no está en la escuela, haberse aplicado en un rango corto de edad de los 12 a 19 años (sólo cuando se incluyen estudiantes de licenciatura el rango se incrementa hacia los 25 años), los estudios hechos en 1991, aquellos hechos en la Ciudad de México y que se han ampliado a partir del 2000 en diversos estados, abarcan población rural y urbana.

Encuestas en hogares sobre adicciones: Las encuestas de hogares abarcan a un rango más amplio de población, incluyen población de 12 a 65 años, abarcan población urbana y rural incluyen población adolescente y adulta que asiste y no asiste a la escuela e incluyen viviendas desde las que se ubican en grandes metrópolis hasta viviendas ubicadas en municipios poco habitados y con índices más bajos de consumo, además al ser autoaplicables tienden a tener un índice más alto de baja

respuesta. En estos estudios se elige en forma aleatoria a uno o más individuos en el hogar, una vez aplicada una cédula de la vivienda. La entrevista regularmente se hace cara a cara y la persona entrevistada sabe que el/a entrevistador/a conoce su nombre y la ubicación de su domicilio. El/a participante elige si participa o no y se le da un formato de consentimiento informado. Dado que es una entrevista cara a cara, la aplicación se realiza en forma individual. Ante ello, es importante que el/la entrevistador/a tenga un alto grado de entrenamiento y manejo de la situación de entrevista, a fin de dirigirla en forma ágil y que se gane la confianza del/a entrevistado/a para que se obtengan respuestas reales, especialmente en temas difíciles como el consumo de drogas o situaciones problemáticas asociadas al consumo. Comúnmente en nuestro país, la población objetivo de estos estudios es aquella que vive en sus hogares, entre los 12 y 65 años de edad y que sepan hablar español.

Estudios con usuarios de drogas (SISVEA, CIJ): Estos estudios se llevan a cabo con población ya consumidora de drogas y que decide asistir a una opción de tratamiento debido a su consumo de drogas, por lo que el 100% de las personas consumen drogas. Por lo común, se aplica una cédula estandarizada sobre el consumo y abuso de diversas drogas y elementos que permiten obtener el perfil de los/as usuarios/as, la aplicación se realiza la primera vez que el/a usuario/a asiste al centro de tratamiento y se aplica en forma de entrevista cara a cara. Debido a estas

situaciones es que los porcentajes de consumo derivados de estos estudios son más altos que en la población de los dos estudios anteriores. Adicionalmente, la proporción de hombres que van a este tipo de tratamiento es mucho mayor, aunque recientemente se está incrementando el número de mujeres que solicitan ayuda por su consumo de droga.

Ante las diferencias en el método y poblaciones de estos tipos de estudios, un punto central para determinar congruencia entre lo que se reporta en unos y otros, es principalmente el orden de preferencia de las drogas, que debe ser similar entre ellos, aunque cuando se da un cambio importante en las preferencias, éste se registra dos o tres años después en los estudios con usuarios de drogas, ya que primero se detecta en los estudios con escolares y población general. Hacer una comparación de prevalencias es posible aunque inadecuado, ya que los rangos de edad no son iguales y los métodos de aplicación de los cuestionarios no son iguales. Otro punto de interés para comparar resultados es la detección de casos de consumo de drogas de más difícil acceso, si está presente el consumo de una droga en el estado, en los tres ámbitos de estudio señalados, debe aparecer la presencia de la droga.

Finalmente, internacionalmente y en el país, es común que las cifras de consumo en hogares son menores a las detectadas en escolares. En el caso de usuarios/as no hay comparación en el indicador, debido a que en el denominador sólo hay usuarios/as.

anexos

A. Drogas

Resultados del estado

Intervalos de confianza

B. Alcohol

Resultados estatales

Intervalos de confianza

C. Estadísticas de fuentes estatales sobre
antecedentes de consumo de drogas

Resultados del estado

Cuadro A1

Características sociodemográficas, según sexo de la población total de 12 a 65 años. Puebla, México, 2008

Características Sociodemográficas	Hombres			Mujeres			Total		
	12-17 años	18-25 años	26-65 años	12-17 años	18-25 años	26-65 años	12-17 años	18-25 años	26-65 años
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Situación escolar									
Estudia actualmente	81.0	21.8	1.4	78.5	23.0	2.5	79.8	22.4	2.0
No estudia	19.0	78.2	98.6	21.5	77.0	97.5	20.2	77.6	98.0
Nivel de estudios									
Ninguna/primaria	36.1	26.8	48.9	33.2	30.1	55.6	34.7	28.6	52.4
Secundaria	46.4	30.4	30.0	47.4	31.1	26.3	46.9	30.8	28.1
Bachillerato o equivalente	17.5	35.1	17.0	18.6	30.2	15.3	18.0	32.4	16.1
Licenciatura	--	7.7	4.1	.8	8.6	2.8	.4	8.2	3.4
Posgrado	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Situación laboral									
Trabaja	21.0	80.5	95.2	12.2	31.9	45.4	16.7	53.7	68.6
Ama de casa	.9	--	.2	10.9	38.0	52.4	5.8	21.0	28.1
Desempleado	78.0	19.5	4.6	76.9	30.0	2.2	77.5	25.3	3.3
Vive con									
Padre y Madre	65.5	52.7	9.2	65.9	35.4	8.9	65.7	43.2	9.0
Sólo padre	2.7	1.5	3.0	1.6	4.9	.9	2.2	3.4	1.9
Sólo madre	24.5	16.1	11.2	26.5	19.8	9.2	25.5	18.1	10.1
Otro	7.3	29.8	76.6	6.1	39.9	80.9	6.7	35.3	78.9
Estado civil									
Casado/unión libre	.6	32.5	81.7	4.7	38.2	68.2	2.6	35.6	74.5
Separado/viudo/divorciado	--	--	4.5	--	2.5	14.2	--	1.4	9.7
Soltero	99.4	67.5	13.8	95.3	59.3	17.6	97.4	63.0	15.8

*Porcentajes obtenidos de la población total por columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A2

Percepción sobre las tendencias del consumo de drogas, según sexo población total de 12 a 65 años. Puebla, México, 2008

N por subgrupo	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
	1 765 080		2 066 237		3 831 317	
Creencias sobre la evolución del problema de las drogas ilegales en los últimos cinco años en México						
Ha incrementado el número de usuarios	1 039 746	58.9	1 216 386	58.9	2 256 132	58.9
Sigue igual	557 644	31.6	621 016	30.1	1 178 660	30.8
Parece que va disminuyendo	167 690	9.5	228 835	11.1	396 525	10.3

*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A3

Percepción sobre las tendencias del consumo de drogas, por grupos de edad población total de 12 a 65 años. Puebla, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%
	1 503 519		865 404		1 462 394	
Creencias sobre la evolución del problema de las drogas ilegales en los últimos cinco años en México						
Ha incrementado el número de usuarios	836 352	55.6	553 632	64.0	866 148	59.2
Sigue igual	457 885	30.5	265 203	30.6	455 572	31.2
Parece que va disminuyendo	209 282	13.9	46 569	5.4	140 674	9.6

*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A4

Percepción sobre las tendencias del consumo de drogas, por grupos de edad en hombres. Puebla, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%
	724 196		385 593		655 291	
Creencias sobre la evolución del problema de las drogas ilegales en los últimos cinco años en México						
Ha incrementado el número de usuarios	411 992	56.9	220 836	57.3	406 918	62.1
Sigue igual	226 210	31.2	144 891	37.6	186 543	28.5
Parece que va disminuyendo	85 994	11.9	19 866	5.2	61 830	9.4

*Porcentajes obtenidos de la población masculina por edad definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A5

Percepción sobre las tendencias del consumo de drogas, por grupos de edad en mujeres. Puebla, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 779 323		26-34 años 479 811		35-65 años 807 103	
	N	%	N	%	N	%
Creencias sobre la evolución del problema de las drogas ilegales en los últimos cinco años en México						
Ha incrementado el número de usuarios	424 360	54.5	332 796	69.4	459 230	56.9
Sigue igual	231 675	29.7	120 312	25.1	269 029	33.3
Parece que va disminuyendo	123 288	15.8	26 703	5.6	78 844	9.8

*Porcentajes obtenidos de la población femenina por edad definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A6

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas, según sexo, población total de 12 a 65 años. Puebla, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 1 765 080		Mujeres 2 066 237		Total 3 831 317	
	N	%	N	%	N	%
Un adicto es una persona						
Enferma	986 492	55.9	1 207 469	58.4	2 193 961	57.3
Débil	557 442	31.6	536 445	26.0	1 093 887	28.6
Independiente	79 938	4.5	155 361	7.5	235 299	6.1
Egoísta	210 990	12.0	178 049	8.6	389 039	10.2
Que necesita ayuda	1 039 997	58.9	1 408 107	68.1	2 448 104	63.9
Delincuente	289 328	16.4	308 487	14.9	597 815	15.6

*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A7

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas, por grupos de edad, población total de 12 a 65 años. Puebla, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 1 503 519		26-34 años 865 404		35-65 años 1 462 394	
	N	%	N	%	N	%
Un adicto es una persona:						
Enferma	827 984	55.1	467 125	54.0	898 852	61.5
Débil	366 342	24.4	303 768	35.1	423 777	29.0
Independiente	103 925	6.9	52 634	6.1	78 740	5.4
Egoísta	139 817	9.3	93 597	10.8	155 625	10.6
Que necesita ayuda	1 018 755	67.8	511 244	59.1	918 105	62.8
Delincuente	266 130	17.7	156 498	18.1	175 187	12.0

*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A8

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas, por grupos de edad en hombres. Puebla, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 724 196		26-34 años 385 593		35-65 años 655 291	
	N	%	N	%	N	%
Un adicto es una persona						
Enferma	362 072	50.0	236 463	61.3	387 957	59.2
Débil	204 897	28.3	143 407	37.2	209 138	31.9
Independiente	45 330	6.3	9 065	2.4	25 543	3.9
Egoísta	59 201	8.2	38 037	9.9	113 752	17.4
Que necesita ayuda	425 751	58.8	185 182	48.0	429 064	65.5
Delincuente	136 333	18.8	53 961	14.0	99 034	15.1

*Porcentajes obtenidos de la población masculina por edad definido en las columnas

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A9

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas, por grupos de edad en mujeres. Puebla, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 779 323		26-34 años 479 811		35-65 años 807 103	
	N	%	N	%	N	%
Un adicto es una persona						
Enferma	465 912	59.8	230 662	48.1	510 895	63.3
Débil	161 445	20.7	160 361	33.4	214 639	26.6
Independiente	58 595	7.5	43 569	9.1	53 197	6.6
Egoísta	80 616	10.3	55 560	11.6	41 873	5.2
Que necesita ayuda	593 004	76.1	326 062	68.0	489 041	60.6
Delincuente	129 797	16.7	102 537	21.4	76 153	9.4

*Porcentajes obtenidos de la población femenina por edad definido en las columnas

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A10

Percepción de la población sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias, según sexo, población total de 12 a 65 años. Puebla, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 1 765 080		Mujeres 2 066 237		Total 3 831 317	
	N	%	N	%	N	%
Considera que estas sustancias producen adicción						
Mariguana	1 203 919	68.2	1 432 491	69.3	2 636 410	68.8
Alucinógenos	645 301	36.6	897 652	43.4	1 542 953	40.3
Cocaína	1 244 795	70.5	1 456 360	70.5	2 701 155	70.5
Heroína	911 990	51.7	1 134 966	54.9	2 046 956	53.4
Inhalables	805 148	45.6	1 027 379	49.7	1 832 527	47.8
Alcohol	1 185 681	67.2	1 533 201	74.2	2 718 882	71.0
Tabaco	1 002 219	56.8	1 322 369	64.0	2 324 588	60.7

*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A11

Percepción de la población total sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias, por grupos de edad. Puebla, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	1 503 519		865 404		1 462 394	
	N	%	N	%	N	%
Considera que estas sustancias producen adicción						
Mariguana	1 081 604	71.9	549 393	63.5	1 005 413	68.8
Alucinógenos	620 962	41.3	324 479	37.5	597 512	40.9
Cocaína	1 074 518	71.5	630 012	72.8	996 625	68.2
Heroína	826 097	54.9	486 864	56.3	733 995	50.2
Inhalables	735 061	48.9	428 413	49.5	669 053	45.8
Alcohol	1 023 322	68.1	597 624	69.1	1 097 936	75.1
Tabaco	942 343	62.7	484 780	56.0	897 465	61.4

*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A12

Percepción de la población sobre opciones de rehabilitación para las personas con dependencia, según sexo. Puebla, México, 2008

N por subgrupo	Hombres		Mujeres		Total	
	1 765 080		2 066 237		3 831 317	
	N	%	N	%	N	%
Rehabilitación más efectiva para un adicto						
Que los metan en la cárcel	8 621	.5	19 502	1.0	28 123	.8
Que los internen en hospitales psiquiátricos	423 318	25.5	492 916	24.7	916 234	25.1
Que los metan en granjas especiales para adictos lejos de la ciudad	666 414	40.2	804 913	40.3	1 471 327	40.3
Curarles en su propio ambiente	404 107	24.4	506 658	25.4	910 765	24.9
Que se curen por su cuenta	103 945	6.3	103 398	5.2	207 343	5.7
Otra	52 219	3.1	69 113	3.5	121 332	3.3

*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A13

Percepción de la población sobre opciones de rehabilitación para las personas con dependencia, por grupos de edad. Puebla, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	1 503 519		865 404		1 462 394	
	N	%	N	%	N	%
Rehabilitación más efectiva para un adicto						
Que los metan en la cárcel	17 053	1.2	6 004	.7	5 066	.4
Que los internen en hospitales psiquiátricos	447 428	31.1	170 570	20.6	298 236	21.5
Que los metan en granjas especiales para adictos lejos de la ciudad	480 626	33.4	397 321	47.9	593 380	42.8
Curarles en su propio ambiente	368 267	25.6	218 728	26.4	323 770	23.4
Que se curen por su cuenta	95 740	6.7	25 171	3.0	86 432	6.2
Otra	30 239	2.1	11 389	1.4	79 704	5.7

*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A14

Percepción de la población sobre el consumo de drogas y algunas consecuencias sociales y de salud, según sexo. Puebla, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 1 765 080		Mujeres 2 066 237		Total 3 831 317	
	N	%	N	%	N	%
El consumo de drogas ilegales tiene relación con:						
La violencia familiar y social	1 579 278	89.5	1 866 688	90.3	3 445 966	89.9
Los accidentes	1 613 959	91.4	1 934 341	93.6	3 548 300	92.6
Si una persona se inyecta con una aguja usada puede adquirir el VIH/SIDA						
	1 509 101	85.5	1 764 147	85.4	3 273 248	85.4
Una persona que se ve sana puede estar infectada de VIH/SIDA						
	1 198 880	67.9	1 299 406	62.9	2 498 286	65.2

*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A15

Percepción de la población sobre el consumo de drogas y algunas consecuencias sociales y de salud, por grupos de edad. Puebla, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 1 503 519		26-34 años 865 404		35-65 años 1 462 394	
	N	%	N	%	N	%
El consumo de drogas ilegales tiene relación con:						
La violencia familiar y social	1 281 323	85.2	830 223	95.9	1 334 420	91.2
Los accidentes	1 355 930	90.2	809 537	93.5	1 382 833	94.6
Si una persona se inyecta con una aguja usada puede adquirir el VIH/SIDA						
	1 326 274	88.2	737 381	85.2	1 209 593	82.7
Una persona que se ve sana puede estar infectada de VIH/SIDA						
	994 995	66.2	582 415	67.3	920 876	63.0

*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A16

Población total de 12 a 65 años que le han ofrecido marihuana regalada o comprada, según edad y sexo. Puebla, México, 2008

Sexo/Edad	N por grupo	Marihuana regalada		Marihuana comprada	
		N	%	N	%
Hombres					
12 - 25	748 040	137 455	18.4	51 863	6.9
26 - 34	365 249	135 651	37.1	53 570	14.7
35 - 65	687 611	151 479	22.0	50 940	7.4
Subtotal	1 800 900	424 585	23.6	156 373	8.7
Mujeres					
12 - 25	819 062	52 211	6.4	18 205	2.2
26 - 34	417 660	7 433	1.8	5 034	1.2
35 - 65	793 676	17 188	2.2	2 538	.3
Subtotal	2 030 398	76 832	3.8	25 777	1.3
Total	3 831 298	501 417	13.1	182 150	4.8

*Porcentajes obtenidos para cada grupo según sexo y edad definido en los renglones
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A17

Población total de 12 a 65 años que le han ofrecido alguna droga regalada o comprada, según edad y sexo. Puebla, México, 2008

Sexo/edad	N por grupo	Cualquier droga regalada		Cualquier droga comprada	
		N	%	N	%
Hombres					
12 - 25	748 040	148 177	19.8	54 263	7.3
26 - 34	365 249	137 362	37.6	58 254	15.9
35 - 65	687 611	160 957	23.4	52 867	7.7
Subtotal	1 800 900	446 496	24.8	165 384	9.2
Mujeres					
12 - 25	819 062	65 926	8.0	27 109	3.3
26 - 34	417 660	7 433	1.8	5 034	1.2
35 - 65	793 676	17 188	2.2	2 538	.3
Subtotal	2 030 398	90 547	4.5	34 681	1.7
Total	3 831 298	537 043	14.0	200 065	5.2

*Porcentajes obtenidos para cada grupo según sexo y edad definido en los renglones
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A18

Índice de exposición a drogas por características sociodemográficas de los usuarios de 12 a 25 años. Puebla, México, 2008

Características sociodemográficas	N por grupo	Marihuana regalada		Marihuana comprada	
		N	%	N	%
Sexo					
Hombres	748 040	137 455	18.4	51 863	6.9
Mujeres	819 062	52 211	6.4	18 205	2.2
Situación Escolar					
Estudiante	786 633	76 606	9.7	26 722	3.4
No estudiante	780 469	113 060	14.5	43 346	5.6
Nivel de escolaridad					
Ninguna/primaria	465 229	44 047	9.5	17 502	3.8
Secundaria	572 815	53 394	9.3	27 570	4.8
Bachillerato o equivalente	365 784	56 253	15.4	20 758	5.7
Licenciatura	60 995	11 124	18.2	4 238	6.9
Posgrado	--	--	--	--	--
Situación laboral					
Trabaja actualmente	560 484	117 379	20.9	40 594	7.2
Ama de casa	214 108	4 964	2.3	2 428	1.1
Desempleado	792 510	67 323	8.5	27 046	3.4
Nivel de ingresos					
Hasta 2 salarios mínimos	1 061 503	117 064	11.0	57 576	5.4
De 3 a 6 salarios mínimos	384 384	47 121	12.3	6 245	1.6
Más de 6 salarios mínimos	62 167	25 481	41.0	6 247	10.0
Vive con					
Padre y madre	847 226	108 936	12.9	40 740	4.8
Sólo padre	43 767	--	--	--	--
Sólo madre	339 680	27 101	8.0	16 488	4.9
Otro	336 429	53 629	15.9	12 840	3.8

*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A19

Índice de exposición a drogas por características sociodemográficas de los usuarios de 26 a 34 años. Puebla, México, 2008

Características sociodemográficas	N por grupo	Marihuana regalada		Marihuana comprada	
		N	%	N	%
Sexo					
Hombres	365 249	135 651	37.1	53 570	14.7
Mujeres	417 660	7 433	1.8	5 034	1.2
Situación escolar					
Estudiante	30 991	--	--	--	--
No estudiante	751 918	143 084	19.0	58 604	7.8
Nivel de escolaridad					
Ninguna/primaria	267 599	22 161	8.3	5 081	1.9
Secundaria	202 837	61 833	30.5	27 233	13.4
Bachillerato o equivalente	189 673	39 808	21.0	16 804	8.9
Licenciatura	22 511	5 677	25.2	5 677	25.2
Posgrado	--	--	--	--	--
Situación laboral					
Trabaja actualmente	559 222	133 828	23.9	55 169	9.9
Ama de casa	209 934	3 435	1.6	3 435	1.6
Desempleado	13 753	5 821	42.3	--	--
Nivel de ingresos					
Hasta 2 salarios mínimos	508 929	70 314	13.8	33 397	6.6
De 3 a 6 salarios mínimos	219 938	61 668	28.0	19 540	8.9
Más de 6 salarios mínimos	11 871	--	--	--	--
Estado civil					
Casado/unión libre	532 778	101 130	19.0	33 767	6.3
Separado/viudo/divorciado	21 215	--	--	--	--
Soltero	228 916	41 954	18.3	24 837	10.8

*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A20

Índice de exposición a drogas por características sociodemográficas de los usuarios de 35 a 65 años. Puebla, México, 2008

Características sociodemográficas	N por grupo	Marihuana regalada		Marihuana comprada	
		N	%	N	%
Sexo					
Hombres	687 611	151 479	22.0	50 940	7.4
Mujeres	793 676	17 188	2.2	2 538	.3
Situación escolar					
Estudiante	14 402	--	--	--	--
No estudiante	1 466 885	168 667	11.5	53 478	3.6
Nivel de escolaridad					
Ninguna/primaria	725 318	58 433	8.1	19 955	2.8
Secundaria	328 361	46 953	14.3	23 939	7.3
Bachillerato o equivalente	115 395	28 185	24.4	5 435	4.7
Licenciatura	41 493	4 149	10.0	4 149	10.0
Posgrado	--	--	--	--	--
Situación laboral					
Trabaja actualmente	993 161	151 931	15.3	42 202	4.2
Ama de casa	427 000	7 224	1.7	2 538	.6
Desempleado	61 126	9 512	15.6	8 738	14.3
Nivel de ingresos					
Hasta 2 salarios mínimos	1 017 722	88 805	8.7	30 905	3.0
De 3 a 6 salarios mínimos	323 815	46 881	14.5	19 445	6.0
Más de 6 salarios mínimos	72 762	14 745	20.3	--	--
Estado civil					
Casado/unión libre	1 154 459	132 895	11.5	42 117	3.6
Separado/viudo/divorciado	197 864	20 131	10.2	3 274	1.7
Soltero	128 964	15 641	12.1	8 087	6.3

*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A21

Índice de exposición a drogas por características sociodemográficas de los usuarios. Puebla, México, 2008

Características sociodemográficas	N por grupo	Cualquier droga regalada		Cualquier droga comprada	
		N	%	N	%
Sexo					
Hombres	1 800 900	446 496	24.8	165 384	9.2
Mujeres	2 030 398	90 547	4.5	34 681	1.7
Situación escolar					
Estudiante	832 026	87 035	10.5	31 434	3.8
No estudiante	2 999 272	450 008	15.0	168 631	5.6
Nivel de escolaridad					
Ninguna/primaria	1 458 146	126 352	8.7	44 675	3.1
Secundaria	1 104 013	174 489	15.8	84 668	7.7
Bachillerato o equivalente	670 852	140 442	20.9	47 944	7.1
Licenciatura	124 999	26 360	21.1	17 042	13.6
Posgrado	--	--	--	--	--
Situación laboral					
Trabaja actualmente	2 112 867	422 299	20.0	148 632	7.0
Ama de casa	851 042	18 374	2.2	10 937	1.3
Desempleado	867 389	96 370	11.1	40 496	4.7
Nivel de ingresos					
Hasta 2 salarios mínimos	2 588 154	300 930	11.6	129 941	5.0
De 3 a 6 salarios mínimos	928 137	164 117	17.7	53 155	5.7
Más de 6 salarios mínimos	146 800	42 658	29.1	8 174	5.6
Estado civil					
Casado/unión libre	1 995 485	285 896	14.3	103 320	5.2
Separado/viudo/divorciado	230 128	22 563	9.8	3 274	1.4
Soltero	1 605 685	228 584	14.2	93 471	5.8
Vive con					
Padre y madre	1 051 964	149 535	14.2	62 429	5.9
Sólo padre	86 997	12 126	13.9	3 639	4.2
Sólo madre	569 028	74 644	13.1	38 009	6.7
Otro	2 123 309	300 738	14.2	95 988	4.5

*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A22

Incidencia acumulada para el uso de cualquier droga en la población total, según edad y sexo. Puebla, México, 2008

Sexo/Edad	N por grupo	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
		N	%	N	%	N	%
Hombres							
12 - 17	385 806	3 753	1.0	3 753	1.0	--	--
18 - 34	727 483	68 786	9.5	63 629	8.7	5 157	.7
35 - 65	687 611	37 264	5.4	37 264	5.4	2 378	.3
Subtotal	1 800 900	109 803	6.1	104 646	5.8	7 535	.4
Mujeres							
12 - 17	372 731	1 078	.3	1 078	.3	--	--
18 - 34	863 991	23 006	2.7	20 963	2.4	2 043	.2
35 - 65	793 676	4 220	.5	2 538	.3	1 682	.2
Subtotal	2 030 398	28 304	1.4	24 579	1.2	3 725	.2
Total	3 831 298	138 107	3.6	129 225	3.4	11 260	.3

*Porcentajes obtenidos según sexo y edad definidos en los renglones para cada tipo de droga
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A23

Incidencia acumulada del consumo de drogas según, sexo en la población total de 12 a 65 años. Puebla, México, 2008

N por subgrupo Drogas	Hombres 1 800 900		Mujeres 2 030 398		Total 3 831 298	
	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	--	--	1 682	.1	1 682	***
Tranquilizantes	5 157	.3	2 043	.1	7 200	.2
Sedantes	--	--	--	--	--	--
Anfetaminas o estimulantes	2 378	.1	--	--	2 378	.1
Mariguana	88 266	4.9	20 750	1.0	109 016	2.8
Cocaína**	28 769	1.6	6 036	.3	34 805	.9
Crack	5 676	.3	--	--	5 676	.1
Alucinógenos	2 378	.1	--	--	2 378	.1
Inhalables	19 886	1.1	3 285	.2	23 171	.6
Heroína opio	--	--	--	--	--	--
Estimulante tipo anfetamínico	9 597	.5	4 363	.2	13 960	.4
Otras drogas	--	--	--	--	--	--
Cualquier droga	109 803	6.1	28 304	1.4	138 107	3.6
Drogas ilegales	104 646	5.8	24 579	1.2	129 225	3.4
Drogas médicas	7 535	.4	3 725	.2	11 260	.3

*Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según sexo definido en las columnas

**Cocaína también incluye crack

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A24

Edad de inicio del consumo de drogas de los usuarios de cada sustancia. Puebla, México, 2008

Drogas	17 años o menos	18 a 25 años	26 a 34 años	35 años o más
	%	%	%	%
Opiáceos	--	--	--	--
Tranquilizantes	--	100.0	--	--
Sedantes	--	--	--	--
Anfetaminas o estimulantes	--	100.0	--	--
Mariguana	59.2	28.7	8.0	4.0
Cocaína	47.7	34.1	5.5	12.6
Crack	--	100.0	--	--
Alucinógenos	--	--	100.0	--
Inhalables	44.9	55.1	--	--
Heroína opio	--	--	--	--
Estimulante tipo anfetamínico	45.5	54.5	--	--
Otras drogas	--	--	--	--
Cualquier droga	52.8	36.2	7.8	3.2

*Porcentajes obtenidos de los usuarios de cada sustancia
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A25

Relación entre mecanismos involucrados en la exposición, el uso de mariguana y otras drogas. Puebla, México, 2008

N por subgrupo Exposición	Mariguana 109 016		Otras drogas 58 169		Cualquier droga 138 107	
	N	%	N	%	N	%
	Sin exposición	1 864	.1	10 614	.3	12 478
Mariguana regalada	28 948	11.0	5 035	1.9	28 948	11.0
Otra droga regalada	2 432	11.5	4 721	22.3	7 153	33.8
Mariguana comprada	14 821	18.1	6 951	8.5	14 821	18.1
Otra droga comprada	--	--	1 927	20.0	1 927	20.0
Mariguana y otra droga regalada	32 456	32.7	16 946	17.1	38 609	38.9
Mariguana y otra droga comprada	13 207	49.4	--	--	13 207	49.4
Mariguana y otra droga regalada y comprada	15 288	38.7	11 975	30.3	20 964	53.1

*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A26

Exposición a la prevención en la población total de 12 a 65 años. Puebla, México, 2008

N por subgrupo Lugar	12-25 años 1 567 102		26-34 años 782 909		35-65 años 1 481 287		Total 3 831 298	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Expuestos a la prevención	737 299	47.0	241 579	30.9	392 525	26.5	1 371 403	35.8
En la escuela	614 227	83.3	72 831	30.1	92 376	23.5	779 434	56.8
En el trabajo	12 239	1.7	46 348	19.2	50 959	13.0	109 546	8.0
En la comunidad	46 223	6.3	62 726	26.0	98 849	25.2	207 798	15.2

*Porcentajes obtenidos por grupo de edad definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A27

Relación del perfil sociodemográfico y su impacto en el uso de drogas, población de 12 a 25 años. Puebla, México, 2008

Exposición	N por grupo	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
		N	%	N	%	N	%
Situación escolar							
Estudia actualmente	832 026	20 402	2.6	15 245	1.9	5 157	.7
No estudia	2 999 272	35 356	4.5	35 356	4.5	--	--
Situación laboral							
Trabaja	2 112 867	26 624	4.8	26 624	4.8	--	--
Ama de casa	851 042	2 751	1.3	2 751	1.3	--	--
Desempleado	867 389	26 383	3.3	21 226	2.7	5 157	.7
Vive con							
Padre y Madre	1 051 964	19 510	2.3	14 353	1.7	5 157	.6
Solo padre	86 997	1 970	4.5	1 970	4.5	--	--
Solo madre	569 028	18 989	5.6	18 989	5.6	--	--
Otro	2 123 309	15 289	4.5	15 289	4.5	--	--
Intento suicida							
Con intento	15 030	--	--	--	--	--	--
Sin intento	1 488 489	62 684	4.2	62 684	4.2	--	--

*Porcentajes de impacto en el uso de drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A28

Consumo de drogas y su relación con el consumo en el entorno en la población total de 12 a 25 años. Puebla, México, 2008

Exposición	N por grupo	Uso de drogas en el individuo					
		Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
Uso de drogas en el entorno		N	%	N	%	N	%
Mariguana	346 420	15 101	9.9	15 101	9.9	--	--
Cocaína	165 855	8 854	15.8	8 854	15.8	--	--
Heroína opio	25 441	--	--	--	--	--	--
Inhalables	126 726	12 350	19.3	12 350	19.3	--	--
Alucinógenos	27 247	--	--	--	--	--	--

*Porcentajes obtenidos por tipo de droga consumida en el entorno definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A29

Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas, población total de 12 a 65 años. Puebla, México, 2008

	Total	
	N	%
Dependencia	7 788	.2
Uso sin dependencia	130 319	3.4
Exposición a drogas sin consumo	415 194	10.8
No consumo	3 277 997	85.6

*Porcentajes obtenidos de cada tipo de necesidad en la población total definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Intervalos de confianza

El intervalo de confianza se interpreta de la siguiente forma. Si se quiere comparar el consumo de cocaína alguna vez entre hombres y mujeres, se hace lo siguiente:

Se busca el valor del consumo de cocaína alguna vez en el cuadro de población masculina que en este caso sería 4.15%; después se busca el dato de cocaína alguna vez en el cuadro de población femenina, que es de 0.72%; de estos datos se elige el porcentaje más alto (población masculina) para considerar su columna de IC 95% (3.728-4.563); posteriormente se ubica si el valor más bajo (población femenina) está por arriba, por abajo o dentro de este intervalo de confianza.

Aquí se observa que 0.72% está por debajo de los intervalos que van de 3.728-4.563, por lo que podemos decir con una confianza de 95% que el nivel de consumo de cocaína alguna vez es más alto en los hombres en comparación con las mujeres.

Los intervalos de confianza también pueden servir para comparar distintos grupos de edad o bien entre distintas sustancias.

Se incluyen los intervalos de confianza nacionales para que cada estado pueda ver cómo se encuentra en relación con el país en general.

Cuadro A30

Consumo de drogas en la población total del país. Puebla, México, 2008

Consumo alguna vez	%	IC95%
Opiáceos	0.14	0.090-0.195
Tranquilizantes	0.58	0.480-0.675
Sedantes	0.18	0.111-0.246
Anfetaminas	0.30	0.223-0.378
Mariguana	4.19	3.885-4.493
Cocaína	2.37	2.146-2.588
Crack	0.59	0.483-0.707
Alucinógenos	0.35	0.270-0.437
Inhalables	0.71	0.592-0.829
Heroína	0.14	0.091-0.194
Metanfetaminas	0.49	0.394-0.585
Otra droga	0.06	0.029-0.098
Cualquier droga	5.72	5.364-6.078
Drogas médicas	1.03	0.890-1.163
Drogas ilegales	5.22	4.871-5.564
Consumo último año		
Opiáceos	0.06	0.023-0.095
Tranquilizantes	0.15	0.112-0.198
Sedantes	0.07	0.018-0.113
Anfetaminas	0.09	0.045-0.136
Mariguana	1.03	0.886-1.169
Cocaína	0.44	0.356-0.524
Crack	0.13	0.083-0.172
Alucinógenos	0.05	0.022-0.082
Inhalables	0.12	0.083-0.165
Heroína	0.04	0.019-0.065
Metanfetaminas	0.11	0.073-0.143
Otra droga	0.01	0.000-0.019
Cualquier droga	1.63	1.448-1.804
Drogas médicas	0.34	0.263-0.420
Drogas ilegales	1.40	1.234-1.566
Consumo último mes		
Opiáceos	0.01	0.000-0.017
Tranquilizantes	0.08	0.046-0.107
Sedantes	0.03	0.000-0.065
Anfetaminas	0.03	0.010-0.058
Mariguana	0.67	0.552-0.787
Cocaína	0.27	0.201-0.333
Crack	0.05	0.023-0.083
Alucinógenos	0.02	0.002-0.033
Inhalables	0.07	0.037-0.103
Heroína	0.01	0.000-0.021
Metanfetaminas	0.07	0.043-0.099
Otra droga	0.01	0.000-0.018
Cualquier droga	1.00	0.853-1.141
Drogas médicas	0.15	0.094-0.198
Drogas ilegales	0.90	0.761-1.038

Cuadro A31

Consumo de drogas en la población masculina del país. Puebla, México, 2008

Consumo alguna vez	%	IC95%
Opiáceos	0.14	0.071-0.206
Tranquilizantes	0.75	0.581-0.910
Sedantes	0.25	0.126-0.365
Anfetaminas	0.44	0.292-0.587
Mariguana	7.19	6.634-7.741
Cocaína	4.15	3.728-4.563
Crack	1.03	0.810-1.244
Alucinógenos	0.59	0.441-0.730
Inhalables	1.28	1.042-1.511
Heroína	0.27	0.167-0.372
Metanfetaminas	0.79	0.617-0.969
Otra droga	0.10	0.033-0.166
Cualquier droga	9.13	8.501-9.755
Drogas médicas	1.27	1.055-1.484
Drogas ilegales	8.77	8.146-9.384
Consumo último año		
Opiáceos	0.03	0.000-0.059
Tranquilizantes	0.16	0.097-0.223
Sedantes	0.09	0.007-0.178
Anfetaminas	0.13	0.041-0.212
Mariguana	1.73	1.472-1.984
Cocaína	0.76	0.603-0.920
Crack	0.23	0.145-0.316
Alucinógenos	0.09	0.028-0.144
Inhalables	0.21	0.132-0.284
Heroína	0.08	0.034-0.116
Metanfetaminas	0.16	0.099-0.229
Otra droga	0.02	0.000-0.040
Cualquier droga	2.49	2.176-2.797
Drogas médicas	0.36	0.241-0.484
Drogas ilegales	2.33	2.028-2.633
Consumo último mes		
Opiáceos	0.01	0.000-0.013
Tranquilizantes	0.07	0.027-0.118
Sedantes	0.05	0.000-0.115
Anfetaminas	0.06	0.009-0.108
Mariguana	1.18	0.963-1.389
Cocaína	0.46	0.332-0.579
Crack	0.11	0.048-0.173
Alucinógenos	0.02	0.000-0.045
Inhalables	0.14	0.070-0.203
Heroína	0.02	0.000-0.044
Metanfetaminas	0.11	0.060-0.166
Otra droga	0.01	0.000-0.037
Cualquier droga	1.65	1.391-1.911
Drogas médicas	0.18	0.086-0.275
Drogas ilegales	1.57	1.313-1.822

Cuadro A32

Consumo de drogas en la población femenina del país. Puebla, México, 2008

Consumo alguna vez	%	IC95%
Opiáceos	0.15	0.066-0.226
Tranquilizantes	0.42	0.318-0.527
Sedantes	0.12	0.056-0.178
Anfetaminas	0.17	0.110-0.234
Mariguana	1.42	1.181-1.650
Cocaína	0.72	0.576-0.870
Crack	0.19	0.118-0.271
Alucinógenos	0.14	0.049-0.230
Inhalables	0.19	0.119-0.256
Heroína	0.02	0.000-0.052
Metanfetaminas	0.21	0.135-0.283
Otra droga	0.03	0.003-0.057
Cualquier droga	2.57	2.262-2.878
Drogas médicas	0.80	0.647-0.956
Drogas ilegales	1.94	1.660-2.215
Consumo último año		
Opiáceos	0.09	0.024-0.149
Tranquilizantes	0.15	0.092-0.209
Sedantes	0.04	0.000-0.085
Anfetaminas	0.06	0.019-0.096
Mariguana	0.38	0.255-0.502
Cocaína	0.14	0.079-0.206
Crack	0.03	0.000-0.064
Alucinógenos	0.02	0.000-0.044
Inhalables	0.05	0.012-0.081
Heroína	0.01	0.000-0.036
Metanfetaminas	0.06	0.025-0.086
Otra droga	0.00	0.000-0.000
Cualquier droga	0.83	0.661-1.001
Drogas médicas	0.32	0.221-0.423
Drogas ilegales	0.54	0.399-0.680
Consumo último mes		
Opiáceos	0.01	0.000-0.026
Tranquilizantes	0.08	0.040-0.122
Sedantes	0.01	0.000-0.030
Anfetaminas	0.01	0.002-0.020
Mariguana	0.20	0.105-0.298
Cocaína	0.09	0.037-0.147
Crack	0.00	0.000-0.002
Alucinógenos	0.02	0.000-0.035
Inhalables	0.01	0.000-0.017
Heroína	0.00	0.000-0.000
Metanfetaminas	0.03	0.009-0.055
Otra droga	0.00	0.000-0.000
Cualquier droga	0.39	0.273-0.511
Drogas médicas	0.11	0.068-0.162
Drogas ilegales	0.28	0.171-0.391

Resultados estatales

Cuadro B1

Prevalencia de alcohol por entidad. Población total de 12 a 65 años. Puebla, México, 2008

Estados	Consumo diario		Bebedores altos	
	N	%	N	%
Aguascalientes	6 435	.8	258 972	33.3
Baja California	6 119	.3	420 914	18.4
Baja California Sur	2 650	.6	125 068	30.4
Campeche	2 758	.5	159 776	28.5
Coahuila	12 239	.7	334 852	18.2
Colima	4 149	1.0	94 042	22.0
Chiapas	32 651	1.1	429 753	14.0
Chihuahua	38 797	1.6	650 901	27.3
Distrito Federal	19 578	.3	2 086 555	32.2
Durango	8 472	.8	250 263	23.7
Guanajuato	9 638	.3	733 743	21.5
Guerrero	12 360	.6	561 476	27.1
Hidalgo	24 135	1.4	498 757	29.8
Jalisco	72 715	1.5	1 497 921	31.1
Estado de México	50 145	.5	2 850 223	26.8
Michoacán	46 278	1.7	902 705	33.4
Morelos	11 394	1.0	409 116	35.6
Nayarit	8 419	1.3	221 084	32.9
Nuevo León	40 089	1.3	947 170	29.7
Oaxaca	24 813	1.0	531 783	22.3
Puebla	34 557	.9	1 127 782	29.4
Querétaro	25 062	2.1	374 771	31.1
Quintana Roo	18 316	1.9	287 795	30.4
San Luis Potosí	15 662	.9	399 486	23.9
Sinaloa	10 691	.6	469 343	25.2
Sonora	3 101	.2	504 802	28.6
Tabasco	14 683	1.0	369 327	25.6
Tamaulipas	14 111	.6	626 093	27.7
Tlaxcala	5 881	.8	249 721	32.0
Veracruz	22 298	.4	1 101 373	21.8
Yucatán	10 155	.8	261 287	19.3
Zacatecas	14 522	1.6	279 184	30.0
Nacional	622 873	.8	20 016 038	26.6

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro B2

Prevalencia de alcohol por entidad. Población Total de 12 a 65 años. Puebla, México, 2008

Estados	Consuetudinarios		Abuso/dependencia	
	N	%	N	%
Aguascalientes	42 736	5.5	61 232	7.9
Baja California	113 508	5.0	34 615	1.5
Baja California Sur	27 705	6.7	21 492	5.2
Campeche	39 467	7.0	44 919	8.0
Coahuila	101 629	5.5	82 313	4.5
Colima	26 086	6.1	12 942	3.0
Chiapas	85 627	2.8	77 213	2.5
Chihuahua	218 191	9.2	112 518	4.7
Distrito Federal	287 497	4.4	364 085	5.6
Durango	72 254	6.8	65 541	6.2
Guanajuato	138 013	4.0	77 977	2.3
Guerrero	78 952	3.8	124 548	6.0
Hidalgo	109 552	6.6	114 527	6.8
Jalisco	309 877	6.4	273 703	5.7
Estado de México	481 829	4.5	621 799	5.8
Michoacán	155 019	5.7	209 659	7.8
Morelos	63 858	5.6	96 298	8.4
Nayarit	51 827	7.7	66 706	9.9
Nuevo León	303 269	9.5	158 254	5.0
Oaxaca	105 220	4.4	129 098	5.4
Puebla	152 070	4.0	296 095	7.7
Querétaro	87 535	7.3	104 334	8.7
Quintana Roo	76 222	8.0	66 162	7.0
San Luis Potosí	100 235	6.0	103 040	6.2
Sinaloa	106 197	5.7	90 975	4.9
Sonora	95 430	5.4	83 223	4.7
Tabasco	55 383	3.8	78 184	5.4
Tamaulipas	188 889	8.4	140 001	6.2
Tlaxcala	20 007	2.6	45 983	5.9
Veracruz	173 120	3.4	284 275	5.6
Yucatán	60 201	4.4	47 116	3.5
Zacatecas	59 056	6.4	79 236	8.5
Nacional	3 986 461	5.3	4 168 063	5.5

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro B3

Prevalencia de alcohol por entidad. Población masculina de 12 a 65 años. Puebla, México, 2008

Estados	Consumo diario		Bebedores altos	
	N	%	N	%
Aguascalientes	6 306	1.7	180 946	48.9
Baja California	5 280	.5	271 534	23.6
Baja California Sur	1 141	.5	86 504	41.1
Campeche	1 734	.6	112 232	40.9
Coahuila	11 905	1.3	245 299	27.0
Colima	2 982	1.4	63 474	30.4
Chiapas	31 232	2.1	300 586	20.2
Chihuahua	37 388	3.2	480 826	40.8
Distrito Federal	16 738	.6	1 277 221	42.0
Durango	8 335	1.6	190 757	37.6
Guanajuato	4 727	.3	510 442	32.2
Guerrero	11 867	1.2	401 325	41.1
Hidalgo	20 172	2.6	366 493	46.6
Jalisco	69 376	3.0	1 004 752	42.9
Estado de México	31 552	.6	1 950 777	38.0
Michoacán	31 268	2.5	613 879	48.7
Morelos	8 061	1.5	260 788	49.1
Nayarit	8 049	2.5	144 065	44.0
Nuevo León	33 502	2.1	751 569	47.5
Oaxaca	21 892	2.0	397 770	35.8
Puebla	27 203	1.5	825 845	45.9
Querétaro	23 062	4.0	262 724	45.9
Quintana Roo	16 132	3.4	192 220	40.1
San Luis Potosí	14 387	1.8	327 208	41.1
Sinaloa	10 691	1.2	357 780	39.0
Sonora	3 101	.4	405 620	46.2
Tabasco	10 647	1.5	274 443	39.2
Tamaulipas	14 111	1.3	510 860	46.1
Tlaxcala	4 590	1.2	178 545	48.1
Veracruz	22 298	.9	793 048	33.1
Yucatán	6 805	1.0	178 279	27.0
Zacatecas	11 255	2.6	211 752	48.4
Nacional	527 789	1.5	14 129 563	39.1

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro B4

Prevalencia de alcohol por entidad. Población masculina de 12 a 65 años. Puebla, México, 2008

Estados	Consuetudinarios		Abuso/dependencia	
	N	%	N	%
Aguascalientes	33 191	9.0	51 034	13.8
Baja California	89 612	7.8	27 555	2.4
Baja California Sur	21 712	10.3	17 201	8.2
Campeche	36 341	13.3	36 202	13.2
Coahuila	79 166	8.7	68 497	7.5
Colima	21 100	10.1	9 573	4.6
Chiapas	71 448	4.8	66 928	4.5
Chihuahua	190 179	16.2	99 550	8.5
Distrito Federal	209 327	6.9	252 788	8.3
Durango	66 327	13.1	56 450	11.1
Guanajuato	108 094	6.8	68 657	4.3
Guerrero	75 101	7.7	101 196	10.4
Hidalgo	92 479	11.8	95 800	12.2
Jalisco	241 366	10.3	217 356	9.3
Estado de México	407 199	7.9	500 463	9.7
Michoacán	129 889	10.3	180 891	14.4
Morelos	52 892	10.0	79 095	14.9
Nayarit	41 264	12.6	56 464	17.2
Nuevo León	283 719	17.9	153 774	9.7
Oaxaca	102 373	9.2	120 929	10.9
Puebla	127 473	7.1	266 885	14.8
Querétaro	71 966	12.6	80 863	14.1
Quintana Roo	62 349	13.0	57 542	12.0
San Luis Potosí	93 093	11.7	94 076	11.8
Sinaloa	85 687	9.3	83 186	9.1
Sonora	89 382	10.2	68 055	7.7
Tabasco	45 586	6.5	64 691	9.2
Tamaulipas	173 078	15.6	128 379	11.6
Tlaxcala	15 424	4.2	41 602	11.2
Veracruz	149 262	6.2	243 318	10.2
Yucatán	50 745	7.7	40 271	6.1
Zacatecas	50 169	11.5	68 675	15.7
Nacional	3 366 993	9.3	3 497 946	9.7

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro B5

Prevalencia de alcohol por entidad. Población femenina de 12 a 65 años. Puebla, México, 2008

Estados	Consumo diario		Bebedores altos	
	N	%	N	%
Aguascalientes	129	***	78 026	19.1
Baja California	839	.1	149 380	13.1
Baja California Sur	1 509	.7	38 564	19.2
Campeche	1 024	.4	47 544	16.6
Coahuila	334	***	89 553	9.6
Colima	1 167	.5	30 568	13.9
Chiapas	1 419	.1	129 167	8.1
Chihuahua	1 409	.1	170 075	14.1
Distrito Federal	2 840	.1	809 334	23.5
Durango	137	***	59 506	10.9
Guanajuato	4 911	.3	223 301	12.2
Guerrero	493	***	160 151	14.6
Hidalgo	3 963	.4	132 264	14.9
Jalisco	3 339	.1	493 169	19.9
Estado de México	18 593	.3	899 446	16.3
Michoacán	15 010	1.0	288 826	20.0
Morelos	3 333	.5	148 328	24.0
Nayarit	370	.1	77 019	22.4
Nuevo León	6 587	.4	195 601	12.2
Oaxaca	2 921	.2	134 013	10.6
Puebla	7 354	.4	301 937	14.9
Querétaro	2 000	.3	112 047	17.8
Quintana Roo	2 184	.5	95 575	20.4
San Luis Potosí	1 275	.1	72 278	8.2
Sinaloa	--	--	111 563	11.8
Sonora	--	--	99 182	11.2
Tabasco	4 036	.5	94 884	12.8
Tamaulipas	--	--	115 233	10.0
Tlaxcala	1 291	.3	71 176	17.4
Veracruz	--	--	308 325	11.6
Yucatán	3 350	.5	83 008	12.0
Zacatecas	3 267	.7	67 432	13.7
Nacional	95 084	.2	5 886 475	15.1

*** El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro B6

Prevalencia de alcohol por entidad. Población femenina de 12 a 65 años. Puebla, México, 2008

Estados	Consuetudinarios		Abuso/dependencia	
	N	%	N	%
Aguascalientes	9 545	2.3	10 198	2.5
Baja California	23 896	2.1	7 060	.6
Baja California Sur	5 993	3.0	4 291	2.1
Campeche	3 126	1.1	8 717	3.0
Coahuila	22 463	2.4	13 816	1.5
Colima	4 986	2.3	3 369	1.5
Chiapas	14 179	.9	10 285	.6
Chihuahua	28 012	2.3	12 968	1.1
Distrito Federal	78 170	2.3	111 297	3.2
Durango	5 927	1.1	9 091	1.7
Guanajuato	29 919	1.6	9 320	.5
Guerrero	3 851	.4	23 352	2.1
Hidalgo	17 073	1.9	18 727	2.1
Jalisco	68 511	2.8	56 347	2.3
Estado de México	74 630	1.4	121 336	2.2
Michoacán	25 130	1.7	28 768	2.0
Morelos	10 966	1.8	17 203	2.8
Nayarit	10 563	3.1	10 242	3.0
Nuevo León	19 550	1.2	4 480	.3
Oaxaca	2 847	.2	8 169	.6
Puebla	24 597	1.2	29 210	1.4
Querétaro	15 569	2.5	23 471	3.7
Quintana Roo	13 873	3.0	8 620	1.8
San Luis Potosí	7 142	.8	8 964	1.0
Sinaloa	20 510	2.2	7 789	.8
Sonora	6 048	.7	15 168	1.7
Tabasco	9 797	1.3	13 493	1.8
Tamaulipas	15 811	1.4	11 622	1.0
Tlaxcala	4 583	1.1	4 381	1.1
Veracruz	23 858	.9	40 957	1.5
Yucatán	9 456	1.4	6 845	1.0
Zacatecas	8 887	1.8	10 561	2.1
Nacional	619 468	1.6	670 117	1.7

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Intervalos de confianza

Cuadro B7

Intervalos de confianza de la población total del país. Puebla, México, 2008

	Población total		Hombres		Mujeres	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Consumo diario	0.8	0.706-0.952	1.5	1.227-1.697	0.2	0.158-0.330
Consumo alto	26.6	25.917-27.370	39.1	38.066-40.229	15.1	14.261-15.902
Bebedores consuetudinarios	5.3	4.954-5.658	9.3	8.671-9.986	1.6	1.325-1.849
Abuso/dependencia	5.5	5.196-5.900	9.7	9.038-10.345	1.7	1.454-1.980

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

C. Estadísticas de fuentes estatales sobre antecedentes de consumo de drogas*

Cuadro C1

Perfil sociodemográfico de la población global que acuden a los centros de tratamiento no gubernamentales (Sisvea). Puebla, México, 2008

Características	Global N = 5811	2002 n= 193	2003 n= 583	2004 n= 608	2005 n= 826	2006 n= 1828	2007 n= 1773
Sexo							
Masculino	93.8	95.9	94.0	96.5	91.6	94.1	93.4
Femenino	6.2	4.1	6.0	3.5	8.4	5.9	6.6
Edad							
5 - 9 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 - 14 años	0.6	0.5	1.0	1.0	1.3	0.4	0.3
15 - 19 años	13.7	10.9	13.6	14.3	17.6	12.3	13.4
20 - 24 años	20.6	25.4	16.6	23.2	21.3	19.5	21.3
25 - 29 años	19.1	22.8	15.8	16.6	18.3	20.1	19.9
30 - 34 años	16.3	13.5	16.5	16.1	14.8	17.3	16.5
35 años o más	29.7	26.9	36.5	28.8	26.8	30.4	28.6
Escolaridad							
Sin escolaridad	3.4	2.6	5.0	3.8	1.7	2.7	4.2
Primaria	25.9	30.1	31.5	24.3	23.7	26.7	24.3
Tec. Posprimaria	0.7	1.0	0.7	0.3	1.0	0.3	1.1
Secundaria	41.8	42.0	37.4	43.8	47.8	40.3	41.3
Tec. Possecundaria	1.0	0.5	2.2	0.5	1.1	1.3	0.5
Bachillerato	23.3	19.7	19.5	23.0	21.5	24.5	24.8
Licenciatura	3.7	3.6	3.8	4.1	2.8	4.1	3.5
Posgrado	0.2	0.5	0.0	0.2	0.4	0.2	0.3
Estado civil							
Soltero	53.8	58.6	54.8	54.3	55.2	52.3	53.6
Casado	22.0	15.7	19.1	20.4	18.7	23.0	24.5
Divorciado	4.2	5.8	5.0	3.3	3.5	5.6	3.0
Separado	6.0	5.8	8.9	7.9	7.2	5.0	4.7
Viudo	0.9	0.5	1.0	1.3	1.3	0.8	0.6
Unión libre	13.2	13.6	11.2	12.7	14.0	13.3	13.6
Situación laboral							
Estudiante	3.1	4.2	5.5	4.2	4.5	2.1	2.3
Desempleado	24.7	6.8	24.8	24.0	27.2	24.6	25.9
Desocupado	13.0	34.2	10.8	8.9	13.1	13.8	11.9
Trabajo fijo	28.4	20.0	26.5	24.3	25.2	31.5	29.8
Trabajo ocasional	28.8	32.1	30.6	38.5	27.1	26.3	27.8
Ama de casa	1.7	1.6	1.6	0.2	3.0	1.4	1.9
Jubilado	0.3	1.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.5
Acudió							
En forma voluntaria	55.6	34.2	53.0	71.2	73.5	51.5	49.2
Por amigos o familia	39.4	64.8	44.6	27.5	25.3	43.5	41.5
Por indicación legal	2.5	0.5	1.7	1.2	0.7	3.1	3.7
Por indicación médica	0.2	0.5	0.7	0.2	0.1	0.1	0.2
Otros	2.3	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	5.4

* Los cuadros de este anexo provienen de los reportes del SISVEA y de los de CIJ.

Cuadro C2

Perfil sociodemográfico de la población global que acude a los centros de tratamiento no gubernamentales según droga de inicio. Puebla, México, 2008

Características	Global		Marihuana		Alcohol		Inhalables		Tabaco		Tranq.		Cocaína *		Heroína		Cristal		Rohypnol		Refractil		D. Médicas**		D. Ilicitas***			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
Sexo																												
Masculino	1656	100	565	34.1	371	22.4	36	2.2	361	21.8	1	0.1	189	11.4	2	0.1	114	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	1.0
Femenino	117	100	7	6.0	48	41.0	1	0.9	50	42.7	0	0.0	3	2.6	0	0.0	7	6.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9
Edad																												
5 - 9 años	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 - 14 años	6	100	3	50.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15 - 19 años	238	100	78	32.8	40	16.8	10	4.2	65	27.3	0	0.0	14	5.9	0	0.0	30	12.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
20 - 24 años	377	100	141	37.4	54	14.3	9	2.4	85	22.5	0	0.0	47	12.5	1	0.3	36	9.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1
25 - 29 años	353	100	113	32.0	71	20.1	9	2.6	90	25.5	1	0.3	39	11.1	1	0.3	26	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9
30 - 34 años	292	100	86	29.5	73	25.0	5	1.7	58	19.9	0	0.0	52	17.8	0	0.0	16	5.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7
35 años o más	507	100	151	29.8	179	35.3	4	0.8	113	22.3	0	0.0	39	7.7	0	0.0	13	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	1.6
Escolaridad																												
Sin escolaridad	75	100	14	18.7	40	53.3	2	2.7	11	14.7	0	0.0	3	4.0	0	0.0	4	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3
Primaria	431	100	165	38.3	104	24.1	13	3.0	71	16.5	0	0.0	36	8.4	0	0.0	40	9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
Tec. Post-primaria	19	100	8	42.1	5	26.3	1	5.3	3	15.8	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Secundaria	733	100	224	30.6	156	21.3	17	2.3	195	26.6	1	0.1	82	11.2	1	0.1	48	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	1.2
Tec. Post-secundaria	9	100	2	22.2	1	11.1	0	0.0	5	55.6	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Bachillerato	439	100	148	33.7	88	20.1	4	0.9	108	24.6	0	0.0	57	13.0	0	0.0	28	6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.4
Licenciatura	62	100	10	16.1	23	37.1	0	0.0	17	27.4	0	0.0	11	17.7	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Posgrado	5	100	1	20.0	2	40.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Estado civil																												
Soltero	950	100	336	35.4	199	20.9	26	2.7	218	22.9	1	0.1	89	9.4	2	0.2	68	7.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	1.2
Casado	435	100	127	29.2	116	26.7	1	0.2	97	22.3	0	0.0	64	14.7	0	0.0	29	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
Divorciado	53	100	21	39.6	3	5.7	0	0.0	18	34.0	0	0.0	5	9.4	0	0.0	3	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.7
Separado	84	100	22	26.2	24	28.6	4	4.8	23	27.4	0	0.0	9	10.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4
Viudo	10	100	1	10.0	4	40.0	0	0.0	4	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Unión libre	241	100	65	27.0	73	30.3	6	2.5	51	21.2	0	0.0	25	10.4	0	0.0	20	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
Situación laboral																												
Estudiante	40	100	13	32.5	7	17.5	0	0.0	14	35.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0	4	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Desempleado	459	100	148	32.2	119	25.9	13	2.8	103	22.4	1	0.2	43	9.4	1	0.2	26	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.1
Desocupado	211	100	94	44.6	25	11.8	5	2.4	21	10.0	0	0.0	36	17.1	0	0.0	29	13.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
Trabajo fijo	528	100	152	28.8	141	26.7	9	1.7	123	23.3	0	0.0	69	13.1	1	0.2	28	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.9
Trabajo ocasional	492	100	162	32.9	106	21.5	10	2.0	134	27.2	0	0.0	41	8.3	0	0.0	32	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.4
Ama de casa	34	100	1	2.9	16	47.1	0	0.0	14	41.2	0	0.0	1	2.9	0	0.0	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Jubilado	9	100	2	22.2	5	55.6	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Acudió																												
En forma voluntaria	873	100	239	27.4	218	25.0	18	2.1	266	30.5	0	0.0	74	8.5	2	0.2	48	5.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	0.9
Por amigos o familia	735	100	260	35.4	162	22.0	13	1.8	131	17.8	1	0.1	91	12.4	0	0.0	70	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.0
Por indicación legal	66	100	26	39.4	18	27.3	1	1.5	6	9.1	0	0.0	11	16.7	0	0.0	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0
Por indicación médica	3	100	1	33.3	1	33.3	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otros	96	100	46	47.9	20	20.8	5	5.2	7	7.3	0	0.0	16	16.7	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0

*Cocaína. Basuco. Crack

**Barbitúricos. Anticolinérgicos. Antidepresivos. Morfina

***Alucinógenos. Otros psicotrópicos

Fuente: SISVEA. Centros de tratamiento no gubernamentales 2007

Cuadro C2.B

Patrón de consumo de población global que acude a los centros de tratamiento no gubernamentales según droga de inicio. SISVEA. Puebla, México, 2008

Características	Global		Marihuana		Alcohol		Inhalables		Tabaco		Tranq.		Cocaína *		Heroína		Cristal		Rohypnol		Refractil		D. Médicas**		D. lícitas***			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
Frecuencia actual																												
Diario	991	100	385	38.9	158	15.9	24	2.4	294	29.7	1	0.1	51	5.1	1	0.1	68	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	0.9
2 - 3 veces por semana	194	100	46	23.7	53	27.3	3	1.5	47	24.2	0	0.0	23	11.9	0	0.0	19	9.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.5
1 vez por semana	358	100	85	23.7	131	36.6	5	1.4	40	11.2	0	0.0	70	19.6	0	0.0	23	6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1
1 - 3 veces por mes	222	100	53	23.9	76	34.2	5	2.3	29	13.1	0	0.0	46	20.7	1	0.5	10	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9
1-11 veces al año	8	100	3	37.5	1	12.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0	2	25.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Edad de inicio																												
9 años o menos	76	100	23	30.3	16	21.1	6	7.9	26	34.2	0	0.0	2	2.6	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6
10 - 14 años	708	100	254	35.9	135	19.1	25	3.5	224	31.6	1	0.1	40	5.7	1	0.1	19	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	1.3
15 - 19 años	722	100	260	36.0	197	27.3	5	0.7	138	19.1	0	0.0	70	9.7	1	0.1	47	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.6
20 - 24 años	151	100	23	15.2	46	30.5	0	0.0	17	11.3	0	0.0	37	24.5	0	0.0	26	17.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3
25 - 29 años	67	100	9	13.4	14	20.9	1	1.5	3	4.5	0	0.0	25	37.3	0	0.0	14	20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5
30 - 34 años	25	100	1	4.0	7	28.0	0	0.0	2	8.0	0	0.0	8	32.0	0	0.0	7	28.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35 años o más	24	100	2	8.3	4	16.7	0	0.0	1	4.2	0	0.0	10	41.7	0	0.0	7	29.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

*Cocaína. Basuco. Crack

**Barbitúricos. Anticolinérgicos. Antidepresivos. Morfina

***Alucinógenos. Otros psicotrópicos

Fuente: SISVEA. Centros de tratamiento no gubernamentales 2007

Cuadro C3.A

Perfil sociodemográfico de la población global que acude a los centros de tratamiento no gubernamentales según droga de impacto. Puebla, México, 2007

Características	Global		Marihuana		Alcohol		Inhalables		Tabaco		Tranq.		Cocaína *		Heroína		Cristal		Rohypnol		Refractil		D. Médicas**		D. lícitas***					
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
Sexo																														
Masculino	1656	100	90	5.4	228	13.8	21	1.3	16	1.0	0	0.0	137	8.3	26	1.6	1124	67.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	0.8		
Femenino	117	100	4	3.4	19	16.2	0	0.0	2	1.7	0	0.0	5	4.3	1	0.9	85	72.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9		
Edad																														
5 - 9 años	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 - 14 años	6	100	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
15 - 19 años	238	100	19	8.0	14	5.9	3	1.3	3	1.3	0	0.0	18	7.6	1	0.4	173	72.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.9		
20 - 24 años	377	100	19	5.0	22	5.8	4	1.1	3	0.8	0	0.0	25	6.6	2	0.5	299	79.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8		
25 - 29 años	353	100	14	4.0	22	6.2	6	1.7	4	1.1	0	0.0	33	9.3	7	2.0	267	75.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
30 - 34 años	292	100	11	3.8	32	11.0	5	1.7	1	0.3	0	0.0	25	8.6	1	0.3	216	74.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3		
35 años o más	507	100	29	5.7	157	31.0	3	0.6	7	1.4	0	0.0	41	8.1	16	3.2	250	49.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.8		
Escolaridad																														
Sin escolaridad	75	100	4	5.3	39	52.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	5	6.7	0	0.0	24	32.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7		
Primaria	431	100	22	5.1	75	17.4	7	1.6	5	1.2	0	0.0	24	5.6	7	1.6	288	66.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7		
Tec. Posprimaria	19	100	2	10.5	4	21.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	12	63.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Secundaria	733	100	35	4.8	72	9.8	10	1.4	7	1.0	0	0.0	58	7.9	16	2.2	529	72.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	0.8		
Tec. Possecundaria	9	100	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	5	55.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Bachillerato	439	100	30	6.8	45	10.3	3	0.7	5	1.1	0	0.0	43	9.8	4	0.9	305	69.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.9		
Licenciatura	62	100	1	1.6	10	16.1	1	1.6	0	0.0	0	0.0	8	12.9	0	0.0	42	67.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Posgrado	5	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	4	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Estado civil																														
Soltero	950	100	62	6.5	104	10.9	12	1.3	7	0.7	0	0.0	67	7.1	12	1.3	672	70.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	1.5		
Casado	435	100	14	3.2	71	16.3	5	1.1	6	1.4	0	0.0	50	11.5	5	1.1	284	65.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Divorciado	53	100	6	11.3	6	11.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.7	3	5.7	35	66.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Separado	84	100	3	3.6	22	26.2	2	2.4	1	1.2	0	0.0	5	6.0	2	2.4	48	57.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2		
Viudo	10	100	0	0.0	3	30.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	6	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Unión libre	241	100	9	3.7	41	17.0	2	0.8	4	1.7	0	0.0	17	7.1	4	1.7	164	68.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Situación laboral																														
Estudiante	40	100	8	20.0	3	7.5	2	5.0	0	0.0	0	0.0	3	7.5	0	0.0	23	57.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5		
Desempleado	459	100	19	4.1	53	11.5	9	2.0	3	0.7	0	0.0	41	8.9	6	1.3	322	70.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.3		
Desocupado	211	100	11	5.2	15	7.1	1	0.5	2	0.9	0	0.0	10	4.7	4	1.9	166	78.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9		
Trabajo fijo	528	100	27	5.1	91	17.2	4	0.8	7	1.3	0	0.0	59	11.2	7	1.3	332	62.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2		
Trabajo ocasional	492	100	29	5.9	72	14.6	5	1.0	6	1.2	0	0.0	28	5.7	10	2.0	337	68.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.0		
Ama de casa	34	100	0	0.0	8	23.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	76.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Jubilado	9	100	0	0.0	5	55.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	3	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Acudió																														
En forma voluntaria	873	100	34	3.9	108	12.4	7	0.8	15	1.7	0	0.0	75	8.6	21	2.4	604	69.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	1.0		
Por amigos o familia	735	100	43																											

Cuadro C3.B

Patrón de consumo de población global que acude a los centros de tratamiento no gubernamentales SISVEA según droga de impacto. Puebla, México, 2007

Características	Global		Marihuana		Alcohol		Inhalables		Tabaco		Tranq.		Cocaína *		Heroína		Cristal	Rohypnol	Refractil	D. Médicas**		D. Ilicitas***						
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
Frecuencia actual																												
Diario	1240	100	61	4.9	151	12.2	15	1.2	16	1.3	0	0.0	67	5.4	24	1.9	895	72.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	0.9		
2 - 3 veces por semana	177	100	9	5.1	20	11.3	3	1.7	0	0.0	0	0.0	20	11.3	0	0.0	124	70.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6		
1 vez por semana	219	100	15	6.8	41	18.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	37	16.9	1	0.5	124	56.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
1 - 3 veces por mes	134	100	9	6.7	35	26.1	3	2.2	2	1.5	0	0.0	18	13.4	2	1.5	64	47.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
1- 11 veces al año	3	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3		
Edad de inicio																												
5 - 9 años	76	100	5	6.6	5	6.6	0	0.0	2	2.6	0	0.0	5	6.6	4	5.3	54	71.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3		
10 - 14 años	708	100	42	5.9	72	10.2	16	2.3	8	1.1	0	0.0	55	7.8	14	2.0	493	69.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	1.1		
15 - 19 años	722	100	41	5.7	107	14.8	4	0.6	7	1.0	0	0.0	55	7.6	9	1.2	495	68.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.6
20 - 24 años	151	100	4	2.6	34	22.5	1	0.7	1	0.7	0	0.0	12	7.9	0	0.0	99	65.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25 - 29 años	67	100	2	3.0	16	23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	11.9	0	0.0	39	58.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0
30 - 34 años	25	100	0	0.0	7	28.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	0	0.0	16	64.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35 años o más	24	100	0	0.0	6	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	20.8	0	0.0	13	54.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Droga de inicio																												
Alcohol	419	100	12	2.9	187	44.6	1	0.2	6	1.4	0	0.0	29	6.9	5	1.2	179	42.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Marihuana	572	100	59	10.3	18	3.1	10	1.7	0	0.0	0	0.0	50	8.7	12	2.1	422	73.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2		
Inhalables	37	100	3	8.1	3	8.1	5	13.5	0	0.0	0	0.0	1	2.7	1	2.7	23	62.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Alucinógenos	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0		
Heroína	2	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Opio-Morfina y deriv.	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Cocaína	191	100	3	1.6	9	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	14.1	0	0.0	151	79.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Tranquilizantes	1	100	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Barbitúricos	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Anfetaminas	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Anticolinérgicos	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Tabaco	411	100	13	3.2	28	6.8	4	1.0	12	2.9	0	0.0	32	7.8	8	1.9	309	75.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Antidepresivos	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Otros Psicotrópicos	17	100	3	17.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	5.9	8	47.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Basuco o pasta base	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Cristal	121	100	1	0.8	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	115	95.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7		
Flunitrazepam (Rohypnol)	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Crack	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Refractil Ofeno	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

*Cocaína. Basuco. Crack

**Barbitúricos. Anticolinérgicos. Antidepresivos. Morfina

***Alucinógenos. Otros psicotrópicos

Fuente: SISVEA. Centros de tratamiento no gubernamentales 2007

Cuadro C4

Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas. Puebla, México, 2007.

Características	Global	Mariguana	Inhalables	Alcohol	Cocaína	Heroína	Tabaco
	n=85	n=32	n=25	n=69	n=7	n=1	n=64
Sexo							
Masculino	92.9	96.9	100.0	91.3	71.4	100.0	92.2
Femenino	7.1	3.1	0.0	8.7	28.6	0.0	7.8
Edad							
5 - 9 Años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 - 14 Años	5.0	3.3	4.0	6.3	0.0	0.0	6.8
15 - 18 Años	95.0	96.7	96.0	93.8	100.0	100.0	93.2
Escolaridad							
Primaria	54.1	59.4	44.0	58.0	28.6	100.0	56.3
Secundaria	36.5	31.3	48.0	30.4	71.4	0.0	34.4
Prepa	2.4	3.1	0.0	2.9	0.0	0.0	3.1
Licenciatura o posgrado	1.2	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.6
No estudio	5.9	6.3	8.0	7.2	0.0	0.0	4.7
Ocupacion							
Estudiante	10.6	9.4	8.0	13.0	14.3	0.0	12.5
Empleado	14.1	9.4	12.0	15.9	14.3	0.0	17.2
Subempleado	63.5	65.6	64.0	59.4	28.6	100.0	60.9
Hogar	1.2	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.6
Ninguna	10.6	15.6	16.0	10.1	42.9	0.0	7.8
Usa tatuajes							
Sí	35.3	53.1	48.0	33.3	42.9	100.0	34.4
No	64.7	46.9	52.0	66.7	57.1	0.0	65.6
Ha pertenecido a una banda							
Sí	8.2	12.5	12.0	7.2	28.6	100.0	7.8
No	91.8	87.5	88.0	92.8	71.4	0.0	92.2
Infracción bajo intoxicación							
Sí	32.9	31.3	48.0	33.3	71.4	0.0	28.1
No	67.1	68.8	52.0	66.7	28.6	100.0	71.9
Tipo de infracción							
Robo	67.1	65.6	52.0	62.3	71.4	100.0	68.8
Violación	14.1	15.6	12.0	15.9	0.0	0.0	15.6
Homicidio	9.4	3.1	20.0	11.6	0.0	0.0	9.4
Lesiones a terceros	2.4	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	1.6
Daños en propiedad ajena	2.4	6.3	8.0	2.9	14.3	0.0	0.0
Secuestro	1.2	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.6
Delitos contra la salud	1.2	3.1	4.0	0.0	14.3	0.0	0.0
Consumo de drogas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Portación de arma	1.2	3.1	0.0	1.4	0.0	0.0	1.6
Otros	1.2	3.1	4.0	1.4	0.0	0.0	1.6
Lugar de la infracción							
Vía pública	70.6	68.8	80.0	71.0	85.7	100.0	70.3
Hogar	10.6	6.3	12.0	11.6	0.0	0.0	12.5
Trabajo	2.4	3.1	0.0	2.9	0.0	0.0	1.6
Escuela	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aeropuerto internacional (Aduana)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lugar de recreo	2.4	3.1	0.0	1.4	0.0	0.0	1.6
Otro	14.1	18.8	8.0	13.0	14.3	0.0	14.1

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007

Cuadro C5


Mortalidad por causas múltiples al consumo de sustancias psicoactivas. Puebla, México, 2006.

CIE	10a Rev. Causa	Núm. de Muertes	Tasa por un millón de hab.
F10	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol.	1492	266.836
F11	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos.	0	0
F12	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides.	1	0.179
F13	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos	0	0
F14	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína.	2	0.358
F15	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína.	0	0
F16	Trastornos mentales y del comportamientos debido al uso de alucinógenos.	0	0
F17	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco.	39	6.975
F18	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles.	0	0
F19	Trastornos mentales y del comportamiento debidos y al uso de otras sustancias psicoactivas.	6	1.073
K70	Enfermedad alcohólica del hígado	707	126.443
X42	Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos (alucinógenos), no clasificados en otra parte.	0	0
X61	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificados en otra parte.	0	0
X62	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos (alucinógenos), no clasificados en otra parte.	0	0
X85	Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas	0	0
Y11	Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificados en otra parte, de intención no determinada.	1	0.179
Y12	Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos (alucinógenos), no clasificados en otra parte, de intención no determinada.	0	0
Y15	Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada.	0	0

Fuente: Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) 2006, DGE/SSA

Figura C1

Tendencias en el consumo de drogas alguna vez en la vida, para la población que acude a centros de tratamiento. Puebla, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro C6

Perfil sociodemográfico de la población global que acude a los Centros de Integración Juvenil, según droga de inicio. Puebla, México, 2007

Características	Global		Tabaco		Alcohol		Mariguana		Cocaína		Inhalables		Estimulantes		De diseño		Alucinógenos		Depresores		Opiáceos		Otras			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
Sexo																										
Masculino	386	100	192	49.7	126	32.6	28	7.3	2	0.5	33	8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.5	0	0.0	1	0.3
Femenino	111	100	50	45.0	51	45.9	1	0.9	2	1.8	6	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Edad																										
9 años o menos	1	100	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 - 14 años	61	100	21	34.4	19	31.1	3	4.9	0	0.0	18	29.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15 - 19 años	136	100	55	40.4	49	36.0	16	11.8	1	0.7	13	9.6	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20 - 24 años	87	100	43	49.4	34	39.1	4	4.6	2	2.3	3	3.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25 - 29 años	73	100	42	57.5	26	35.6	2	2.7	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4
30 - 34 años	38	100	21	55.3	13	34.2	1	2.6	0	0.0	3	7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35 años o más	97	100	57	58.8	35	36.1	2	2.1	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Estado civil																										
Soltero	234	100	117	50.0	71	30.3	19	8.1	2	0.9	23	9.8	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Casado	65	100	36	55.4	23	35.4	3	4.6	1	1.5	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Unión libre	62	100	33	53.2	25	40.3	1	1.6	1	1.6	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Separado	31	100	20	64.5	9	29.0	0	0.0	0	0.0	2	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Divorciado	7	100	4	57.1	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Viudo	7	100	4	57.1	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
No específica	91	100	28	30.8	44	48.4	6	6.6	0	0.0	11	12.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1
Escolaridad																										
Sin estudios (no sabe leer ni escribir) ²	2	100	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sin estudios (sabe leer y escribir)	5	100	3	60.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Primaria	61	100	26	42.6	25	41.0	5	8.2	1	1.6	4	6.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Secundaria	201	100	89	44.3	63	31.3	16	8.0	1	0.5	31	15.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Técnico o comercial	28	100	15	53.6	11	39.3	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Bachillerato	107	100	55	51.4	43	40.2	3	2.8	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.9	0	0.0	1	0.9	0	0.0
Licenciatura	80	100	51	63.8	23	28.8	5	6.3	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Posgrado	3	100	1	33.3	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ocupación																										
Estudiante	124	100	48	38.7	45	36.3	8	6.5	0	0.0	22	17.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Estudia y trabaja	20	100	14	70.0	4	20.0	1	5.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Laboral estable	134	100	75	56.0	48	35.8	5	3.7	1	0.7	3	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7	0	0.0
Laboral inestable	93	100	39	41.9	39	41.9	4	4.3	1	1.1	7	7.5	0	0.0	0	0.0	2	2.2	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Desempleado	34	100	23	67.6	8	23.5	1	2.9	0	0.0	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Desocupado	35	100	15	42.9	13	37.1	4	11.4	1	2.9	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Hogar	26	100	13	50.0	12	46.2	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Pensionado	4	100	3	75.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Nivel socioeconómico																										
Alto	5	100	4	80.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Medio alto	40	100	25	62.5	9	22.5	4	10.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Medio bajo	144	100	74	51.4	52	36.1	7	4.9	0	0.0	8	5.6	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
Bajo	288	100	128	44.4	110	38.2	17	5.9	3	1.0	28	9.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Pobreza extrema	1	100	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro C7

Perfil sociodemográfico de la población global que acude a los centros de integración juvenil, según droga de impacto. Puebla, México, 2007

Características	Global		Tabaco		Alcohol		Mariguana		Cocaína		Inhalables		Estimulantes		De diseño		Alucinógenos		Depresores		Opiáceos		Otras	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Sexo																								
Masculino	379	100	56	14.8	130	34.3	63	16.6	48	12.7	74	19.5	1	0.3	0	0.0	2	0.5	1	0.3	2	0.5	2	0.5
Femenino	100	100	27	27.0	39	39.0	7	7.0	10	10.0	17	17.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Edad																								
9 años o menos	1	100	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 - 14 años	57	100	4	7.0	16	28.1	4	7.0	0	0.0	33	57.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15 - 19 años	130	100	6	4.6	37	28.5	29	22.3	14	10.8	41	31.5	1	0.8	0	0.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20 - 24 años	87	100	14	16.1	33	37.9	16	18.4	14	16.1	9	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
25 - 29 años	71	100	12	16.9	30	42.3	9	12.7	13	18.3	5	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8
30 - 34 años	38	100	7	18.4	16	42.1	8	21.1	6	15.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35 años o más	91	100	39	42.9	36	39.6	2	2.2	10	11.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1	0	0.0
Estado civil																								
Soltero	226	100	26	11.5	74	32.7	39	17.3	25	11.1	58	25.7	1	0.4	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.4
Casado	63	100	19	30.2	26	41.3	3	4.8	13	20.6	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Unión libre	61	100	14	23.0	20	32.8	10	16.4	7	11.5	9	14.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
Separado	28	100	4	14.3	10	35.7	4	14.3	5	17.9	4	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0
Divorciado	7	100	3	42.9	3	42.9	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Viudo	7	100	4	57.1	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
No específica	87	100	13	14.9	34	39.1	14	16.1	7	8.0	17	19.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1
Escolaridad																								
Sin estudios (no sabe leer ni escribir)	2	100	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sin estudios (sabe leer y escribir)	4	100	2	50.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Primaria	60	100	16	26.7	18	30.0	11	18.3	4	6.7	10	16.7	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Secundaria	188	100	26	13.8	53	28.2	26	13.8	19	10.1	62	33.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0
Técnico o comercial	28	100	8	28.6	12	42.9	2	7.1	3	10.7	3	10.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Bachillerato	103	100	12	11.7	42	40.8	16	15.5	17	16.5	11	10.7	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	2	1.9
Licenciatura	80	100	17	21.2	36	45.0	15	18.8	11	13.8	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Posgrado	3	100	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ocupación																								
Estudiante	117	100	10	8.5	37	31.6	20	17.1	6	5.1	43	36.8	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Estudia y trabaja	19	100	1	5.3	8	42.1	3	15.8	2	10.5	5	26.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Laboral estable	130	100	33	25.4	49	37.7	13	10.0	24	18.5	9	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5
Laboral inestable	92	100	15	16.3	35	38.0	10	10.9	10	10.9	18	19.6	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1	2	2.2	0	0.0
Desempleado	34	100	3	8.8	11	32.4	11	32.4	5	14.7	4	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Desocupado	33	100	4	12.1	15	45.5	5	15.2	3	9.1	5	15.2	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Hogar	25	100	11	44.0	9	36.0	2	8.0	2	8.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Pensionado	3	100	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Nivel socioeconómico																								
Alto	5	100	4	80.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Medio Alto	39	100	13	33.3	13	33.3	7	17.9	6	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Medio Bajo	141	100	22	15.6	51	36.2	22	15.6	29	20.6	13	9.2	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	2	1.4
Bajo	274	100	39	14.2	103	37.6	35	12.8	19	6.9	74	27.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	0	0.0
Pobreza Extrema	1	100	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Droga de inicio																								
Tabaco	234	100	63	26.9	73	31.2	35	15.0	30	12.8	30	12.8	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.4
Alcohol	168	100	16	9.5	88	52.4	17	10.1	22	13.1	24	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
Mariguana	28	100	3	10.7	3	10.7	13	46.4	3	10.7	6	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Cocaína	4	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Inhalables	38	100	0	0.0	3	7.9	4	10.5	0	0.0	30	78.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0
Estimulantes	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
De diseño	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Alucinógenos	2	100	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Depresores	1	100	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0

Cuadro C8

Tendencias de la droga de inicio en pacientes que acuden a centros de tratamiento no gubernamentales global. Puebla, México.

Droga inicio	Año					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Alcohol	20.0	44.8	57.7	56.9	62.0	65.1
Mariguana	60.0	29.3	14.7	10.8	12.0	7.6
Inhalables	0.0	20.7	18.3	12.5	12.2	8.1
ALUCINÓGENOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Heroína	0.0	0.0	0.7	0.3	1.0	0.8
Cocaína	20.0	3.4	6.5	3.1	3.3	2.5
Tranquilizantes	0.0	0.0	0.4	0.8	0.5	0.4
Anfetaminas	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.2
Tabaco	0.0	0.0	0.2	14.9	8.4	14.2
Cristal	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2
Crack	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.6
Refractil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Opio/morf	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbitúricos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anticóli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
Antidepresivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Basuco	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Rohypnol	0.0	1.7	0.7	0.0	0.1	0.0

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro C9

Tendencias de la droga de impacto en pacientes que acuden a centros de tratamiento no gubernamentales global. Puebla, México.

Droga impacto	Año					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Alcohol	0.0	48.3	49.2	52.6	58.2	61.8
Mariguana	40.0	24.1	11.6	11.9	11.0	6.9
Inhalables	20.0	13.8	12.5	12.6	10.2	10.0
AlucinÓGENOS	0.0	0.0	1.6	0.3	0.3	0.4
Heroína	20.0	1.7	4.5	2.7	4.1	1.7
Cocaína	20.0	8.6	17.6	11.4	8.8	7.6
Tranquilizantes	0.0	0.0	0.4	1.6	0.6	0.4
Anfetaminas	0.0	0.0	1.6	0.2	0.2	0.0
Tabaco	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	5.7
Cristal	0.0	1.7	0.2	0.2	0.3	0.4
Crack	0.0	1.7	0.9	3.4	3.4	4.9
Refractil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Opio/morf	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
Barbitúricos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anticóli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antidepresivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Basuco	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.1
Rohypnol	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Encuesta Nacional de Adicciones 2008
Resultados por entidad federativa, Puebla

Se terminó de imprimir en marzo de 2009.
La edición consta de 200 ejemplares y estuvo al cuidado
de la Subdirección de Comunicación Científica
y Publicaciones del Instituto Nacional de Salud Pública.

